

gr. de son et une cuillerée à soupe de biborate de soude par litre.

4° Le soir faire un savonnage des points malades avec du savon au naphthol; y passer ensuite de l'eau de vie camphrée.

5° Puis mettre sur les boutons pour la nuit un peu de la pommade suivante dans laquelle on augmentera ou diminuera la dose de vaseline suivant l'effet produit:

Napthol B camphré.	30 centigr.
Résorcine.	20 —
Savon noir.	20 —
Craie préparée.	50 —
Soufre précipité.	1 gr. 50
Vaseline pure.	20 gr.

6° Le matin après la toilette passer sur la figure du mélange suivant:

Borate de soude.	10 gr.
Ether sulfurique camphré.	40 —
Eau distillée de rose.	100 —
Eau distillée.	150 —

TRAITEMENT DES VERS INTESTINAUX

Voici le traitement préconisé par Metchnikoff dans le cas d'ascaris ou de trichocéphale, qu'il considère, ainsi qu'on se le rappelle, comme étant une cause plus fréquente qu'on ne le croit d'appendicite.

Pour les ascaris, M. Metchnikoff recommande la santonine. On sait que la dose est, pour les enfants, de 2 à 5 centigrammes et, pour les adultes, de 10 à 15 centigrammes, soit en dragées ou tablettes ou, mieux, mélangées à de l'huile d'olive. Quelques heures après, il est utile de prendre un purgatif.

Pour le trichocéphale le traitement n'est plus le même, M. Metchnikoff préconise alors le thymol sous la forme suivante:

Pour l'adulte:

Thymol 3 à 4 grammes, à prendre dans la matinée.

Le thymol doit pouvoir se mélanger à une poudre inerte quelconque permettant de l'envelopper dans un cachet.