

- 22(21) Aréole des ailes antérieures triangulaire,
oblique, pédiculée..... 11. **alboricta**.
- 23(20) Ecusson taché de blanc;
- 24(25) Chaperon noir, sans aucune tache;
flancs noirs..... 12. **inquisitor**.
- 25(24) Chaperon plus ou moins blanc; flancs
ordinairement roux;
- 26(27) Le chaperon entièrement, avec un point
de chaque côté du métathorax, blanc... 12. **rufopectus**.
- 27(26) Le chaperon taché seulement de blanc;
métathorax sans taches..... 14. **scriptifrons**.
- 28(2) Pattes entièrement rousses..... 15. **ptereles**.
- 29(1) Thorax noir; abdomen taché de blanc
ou de roux;
- 30(31) Abdomen noir, ses segments marginés de
blanc au sommet 16. **conquisitor**.
- 31(30) Abdomen noir, les segments médians
plus ou moins roux..... 17. **rufovariata**.

1. Pimple pieds-noirs. *Pimpla pedalis*, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. iv, p. 268, ♂.

♀—Long. .55; tarière .30 pouce. Noir; antennes brunes, grêles. Thorax brillant, peu ponctué; métathorax strié transversalement au milieu. Ailes hyalines, légèrement enfumées, nervures et stigma, noir, ce dernier avec une tache blanche à la base; aréole triangulaire, non pétiolée, un peu oblique. Pattes fortes, d'un roux foncé; les hanches antérieures avec les genoux postérieurs, leurs jambes et leurs tarsi, noirâtres. Abdomen fort épaissi vers l'extrémité, densément ponctué, excepté aux sutures et sur les 2 derniers segments. Tarière forte, rousse, à gaines noires, comprimées, velues, dépassant l'abdomen du tiers de sa longueur.—CC.

♂—Même coloration que dans la ♀; abdomen rétréci à la base et à l'extrémité.

Nous avons fréquemment capturé cet insecte sur la verge d'or *Solidago Canadensis*. Lorsqu'on saisit la ♀ avec les doigts, elle est assez prompte à nous lancer sa tarière dans les chairs, mais sa piqûre est assez peu douloureuse.

2. Pimple à-cornes-grêles. *Pimpla tenuicornis*, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. iv, p. 267, ♂.

♂ ♀—Long. .40 pce. Noir avec les pattes d'un beau roux clair.