

l'intérieur d'une caverne, elle est plus difficile à arrêter. D'emblée, on a recours aux ventouses sèches, aux injections d'ergotine, aux inhalations de perchlorure de fer. Si on a une ventouse de Junod, c'est le cas de l'appliquer. On peut couvrir la poitrine de glace, suivant la méthode allemande, en la renouvelant souvent; mais la gravité et l'abondance de ces hémorrhagies ne permettent pas ordinairement de les traiter à temps: elles sont donc presque toujours mortelles, sinon la première, du moins la deuxième ou la troisième, car elles se succèdent rapidement.—*Le Médecin Praticien.*

—

Des éruptions médicamenteuses.—Nous croyons devoir mettre sous les yeux de nos lecteurs le tableau suivant des éruptions plus ou moins manifestes et constantes que peuvent produire certains médicaments.

Quinine: Erythème scarlatineux. Erythème papuleux (Köhner). Hémorrhagie et purpura (gauche). Pemphigus, œdème et prurit (Kigu).

Cinchonine, belladone, stramoine, strychnine: les mêmes manifestations que précédemment.

Digitale: Erythème à la suite d'un usage prolongé (Traube).

Aconit: Exanthème vésiculeux.

Santonine: Pemphigus, vésicules (Deschamps).

Opium et morphine: Erythème (Apolan); éruption papuleuse avec forte desquamation et prurit.

Pilocarpine: Augmentation des sueurs.

Atropine: Diminution de la sueur.

Phosphore: Purpura.

Mercure (usage interne): Erythème (Kalus, Zaissi, Gamberini); eczéma (Aley, Fournier, Gamberini).

Arsenic: Erythème et papules (Imberts-Gourbayre); vésicules et pustules (Bazin, Raymondi, Gamberini).

Acide phénique: Erythème (Taourschis); pemphigus (Zaissi).

Acide salicylique: Purpura (Freudentberg); angine vésiculeuse, pemphigus.

Chlorhydrate: Erythème peu coloré, prurit, desquamation, purpura et pétéchies (Crichton et Brown); eczéma croûteux et squames (Kirn).

Baume de copahu, zubèbe et thérebentine: Pemphigus, erythème, eczéma (Renter).

Huile de foie de morue: Acné.

Iodure de potassium: Papules, vésicules (Bumslead, Gam-