Fam. V. LOCUSTAIRES. *Locustariæ.* Vol. VIII, p. 72.

Gen. PHYLLOPTERA, Serv. Vol. VIII, p. 75.

Page 76, au lieu de:

Phylloptère feuille-oblongue. *Phylloptera oblongifolia*, Burm.

lisez :

Phanéroptère queue-courbe. *Phaneroptera (Scudderia) curvicauda*, DeGéer.

Gen. XIPHIDION. *Xiphidium*, Serv.

Ce genre ne diffère des Orchélines que par le présternum qui est mutique au lieu d'être bidenté, et par la plaque sous anale de l'abdomen qui est grande et fourchue dans les ♂. Les élytres sont aussi plus courtes que chez les Orchélines.

Deux espèces rencontrées.

1. **Xiphidium brévipenne.** *Xiphidium brevipennis*, Scudd.—

Long. .45 pouce. Vert, piqué finement de brun sur la face et le prothorax. Antennes jaunes, brunâtres à l'extrémité, très longues. Prothorax avec une bande dorsale brune, bordée de chaque côté de jaune-clair, se continuant sur la tête en se rétrécissant jusque sur la pointe du vertex entre les antennes, et se prolongeant à peine en arrière sur le troisième lobe du prothorax. Elytres jaune-pâle, n'atteignant pas l'extrémité de l'abdomen; les ailes un peu plus courtes. Dos de l'abdomen brun de même que les appendices. Tarière de la ♀ brun-rougeâtre, dilatée au milieu et légèrement courbée, presque aussi longue que les cuisses postérieures. Pattes vertes, les cuisses postérieures avec une ligne brune au milieu en dehors, leurs genoux aussi bruns.

Très commun dans les prés humides, ayant toute l'apparence extérieure des Orchélines, mais de taille plus petite, et avec les élytres beaucoup plus courtes.

2. **Xiphidium fascié.** *Xiphidium fasciatus*, Serv.

C'est l'insecte décrit à la p. 78, vol. VIII, sous le nom de *Orchelimum gracile*.

Fam. VI. ACRIDITES. *Acridites.* Vol. VIII, p. 78.

Gen. ARCYPTÈRE. *Arcyptera*, Serville.

Ce genre, qui est très rapproché des Œdipodes, s'en