

Gen. CHORDEILES. Swainson.

Soies de la base du bec très courtes; ailes très longues, la 1ère des primaires égale ou presque égale à la 2e, toutes non émarginées à leur bord interne; queue longue, légèrement échancrée.

L'Engoulevent popetué. *Chordeiles popetue*, Baird. *Caprimulgus pop.*, Vieillot; *Capr. Americanus*, Wils. *Capr. Virginianus*, Aud.—Vulg. *Mangeur de Maringouins*; Angl. *Night-Hawk*, *Bull Bat*.—Longueur 9½ pouces; ailes 8¼. Parties supérieures d'un brun verdâtre, tachetées de gris et de jaunâtre; une tache blanche en forme de V à la gorge, suivie d'un collier de taches d'un roux pâle; pennes alaires d'un brun uniforme; les 5 primaires extérieures avec une tache blanche n'atteignant cependant pas le bord extérieur de la 1ère; queue avec une tache blanche terminale.

Femelle sans blanc à la queue et avec le blanc de la gorge tacheté de rougeâtre.

E. et CC. Tout le monde connaît cet Engoulevent qui, durant tout l'été, commence à voltiger dans l'air en faisant entendre son cri peu de temps avant le coucher du soleil, pour le continuer jusqu'à l'aurore du lendemain. Il se nourrit exclusivement d'insectes; niche sur la terre, dans les lieux déserts, pond de deux à 4 œufs d'un blanc sale, ponctués de brun de différentes nuances.



La SAPERDE BLANCHE.

Saperda candida, Fabricius. *Saperda bivittata*, Say.

Nous avons déjà fait connaître, à la page 112 du présent volume, un ennemi bien redoutable des pommiers, le Kermès; en voici un autre dont les ravages sont encore plus désastreux; c'est la Saperde blanche, que la fig. 36, représente de grandeur naturelle, de même que sa larve. La plupart des vergers des environs de Québec sont disparus sous la dent de cet insecte. Et cet ennemi est d'autant plus redoutable, qu'il est en tout temps disposé à exercer ses ravages, sans requérir aucune disposition particulière de l'arbre sur lequel il se trouve. Que l'arbre soit plein de