

*40. *FICUS insipida*. W.

F. foliis oblongis acuminatis integerrimis basi angustatis glabris parallelo-venosis, receptaculis subrotundis pedunculatis. W.

Geschnacklose Feige. W.

Habitat ad Caracas. *h.* (v. f. f.) *Bredemeyer*.

Arbor altissima cortice ex cinereo ferrugineo glabro. Folia petiolata septempollicaria oblonga basi parum angustata apice acuminata, acumine brevi obtuso, margine integerrima, utrinque glabra, parallelo-venosa. Receptacula pedunculata magnitudine ovi gallinacei subrotunda immatura verrucosa, matura crocea viridi-maculata insipida. W.

*41. *FICUS callosa*. W.

F. foliis oblongis obtusis basi angustatis integerrimis subtus scabriusculis, receptaculis umbilicatis. *Willd. Act.*

Acad. Berol. 1798. p. 102. t. 4.

Knorpel-Feige. W.

Habitat in India orientali. *h.* (v. f.)

Rami teretes fusci glabri. Folia petiolata quadri- seu quinquepollicaria oblonga obtusa, basi parum angustata punctisque binis callosis supra instructa, margine integerrima, venosa, supra saturate viridia nitida, subtus pallidiora scabriuscula. Receptacula globosa magnitudine Cerasi umbilicata. W.

42. *FICUS benjamina*.

F. foliis elliptico-oblongis integerrimis basi angustatis apice obtuse acuminatis tenuissime parallelo-venosis glabris supra albo-punctatis, receptaculis globosis subsessilibus. W.

F. foliis ovatis acuminatis transverse striatis margine laevi. *Mant.* 129.

Ficus microcarpa. *Lin. suppl.* 442.

F. arbor densioribus foliis parvis integris. *Pluk. phyt. t.* 243. f. 4.

Itty-alu. *Rheed. mal.* 1. p. 45. t. 26.

Varinga parvifolia. *Rumph. amb.* 3. p. 139. t. 90.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 539.

Benjanen-Feige. W.

Habitat in India orientali. *h.* (v. v. f. f.)

Lin. Sp. Pl. Tom. IV. P. II.

K k