

tive est localisée à l'estomac, ce qui est rare et se manifeste par une douleur à l'épigastre.

Thermométrie locale.—Ce mode d'investigation peut rendre quelques services dans l'étude des diarrhées. D'après Moncorvo, alors qu'il n'y a ni réaction générale ni fièvre, on peut déceler la présence d'un certain degré d'entérite par la température locale. Ainsi, normalement la température de la paroi abdominale, est de 35° à $35,5^{\circ}$. En cas de diarrhée cette température monte à 36° ou $36,5^{\circ}$ d'un degré en moyenne.

Urine.—A l'état normal, le nourrisson urine plus que l'adulte par rapport à son poids (80 à 100 gram. jusqu'au 10e jour, puis 300 gram. jusqu'au 4ème mois ; puis 500 gram.) Dans les formes légères, la quantité n'augmente pas ; au contraire elle baisse à 50 gram., 30 gram. ; si le cas est grave. Claire et jaune à l'état normal et dans les formes légères, l'urine devient brune, foncée, trouble et sale dans les cas graves. L'acidité augmente dans la maladie ; de même la densité qui, de 1002 à 1005 monte à 1015 et 1020.

Formes de la gastro-entérite aigue.

1° *Forme légère, banale.*—Toute la symptomatologie se réduit aux vomissements et à la diarrhée que nous venons d'étudier. Toutes les variantes précédemment décrites peuvent être observées, (vomissements légers ou tenaces, indolores ou douloureux, diarrhée légère ou intense, jaune ou panachée, avec ou sans poussées biliaires). Tout est variable et comme aspect et comme intensité. La caractéristique de cette affection au petit pied est l'absence de réaction de ces troubles digestifs sur l'état général. Elle est toute localisée à l'appareil digestif. L'enfant est simplement un peu souffrant. La température est normale, ainsi que le poids, parfois cependant on peut observer des accès de fièvre très légers et de courte durée (à 38°). Tous les termes de passage entre cette *injection minima* et.....