

THERAPEUTIQUE

ATTAQUES APOPLECTIQUES

PAR LE

DOCTEUR G. LEMOINE

Sous cette dénomination on réunit des états cérébraux, qui sont très différents par leurs causes, mais qui ont de très grandes ressemblances dans leurs manifestations cliniques. L'apoplexie est surtout caractérisée par la perte de la connaissance, avec persistance de la respiration et de la circulation, et par l'abolition des mouvements volontaires ; cependant, dans bien des cas, dans les attaques apoplectiformes par exemple, ou dans celles qui sont sous la dépendance d'une thrombose cérébrale ou d'une tumeur, la perte de la connaissance et la paralysie peuvent être très incomplètes. Les causes des attaques apoplectiques sont fort nombreuses ; les unes sont liées à des phénomènes congestifs, congestion, hémorrhagie cérébrale, les autres à une anémie brusque de tout un territoire cérébral, par ramollissement cérébral. Les causes éloignées sont plus intéressantes à connaître : maladies du cœur, hypertrophie, myocardite, caillots intra-cardiaques fournissant des embolies ; tempérament congestif ; artério-sclérose et athérome, anévrysmes miliaires ; péri-encéphalite, sclérose en plaques, productions syphilitiques déterminant des poussées congestives par irritation de voisinage ; etc. D'une façon plus générale on peut dire que l'apoplexie est liée à deux ordres de causes ; les altérations du système circulatoire et les néoplasies cérébrales. Dans bien des cas il y aurait le plus grand intérêt à faire un diagnostic causal précis, mais malheureusement, c'est souvent une chose fort difficile.

A. CONGESTION ET HÉMORRHAGIE CÉRÉBRALES

Il n'est pas toujours facile de les distinguer, au début, l'une de l'autre ; elles sont caractérisées par un ictus apoplectique, la perte de la connaissance et une hémiplégie qui occupe le côté du corps opposé à celui où siège la lésion dans le cerveau. Dans la congestion l'ictus et la perte de connaissance peuvent être incomplets, la paralysie peut être limitée et dure moins longtemps que dans l'hémorrhagie. Dans tous les cas, les accidents se montrent chez des gens sanguins, de tempérament congestif, ayant un cœur volumineux et des vaisseaux touchés par l'artério-sclérose. Dans une certaine mesure, on peut reconnaître quelles sont les personnes prédisposées à l'apoplexie d'origine congestive et leur faire suivre un traitement préventif.