



OPOTHÉRAPIE SÉRIQUE

DÉCHÉANCES ORGANIQUES,
CONVALESCENCES,
ANÉMIES.

SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE FRAIS de CHEVAL
(Sirop)

Agent de Régénération Hématique, de Leucopoïèse et de Phagocytose,

2 à 4 cuillerées à potage par jour.

LANCOSME, 71, Av. Vict.-Emmanuel-III, PARIS (8°).

Lit^{re}, Échantil^{on} : ROUGIER, 210, r. Lemoine, MONTRÉAL.

DES MILLIERS DE CAS RAPPORTES DEMONTRENT QUE

CAPROKOL

(Hexylresorcinol, S. & D.)

est INESTIMABLE dans

PYELITE — Aiguë ou chronique.

CYSTITE — Aiguë ou chronique.

URETRITE — Spécifique ou non-spécifique.

PROPHYLAXIS — Avant et après instrumentation ou opération.

INFECTIONS SECONDAIRES — Associées avec la Prostatite
ou d'autres foyers infectieux.

APPROXIMATIVEMENT QUARANTE-CINQ FOIS LA FORCE GERMICIDE
DU PHENOL ET NON-TOXIQUE EN DOSES THERAPEUTIQUES.

SOULAGEMENT et CONFORT du PATIENT PROMPTEMENT APPORTES.

Pour adultes—En capsules. Boîtes de 100.

Pour enfants—Solution (dans l'huile d'olive). En bouteilles de 4 onces.

PARFAITEMENT SUR — CLINIQUEMENT EFFECTIF.

NOTE:—L'efficacité du CAPROKOL (Hexylresorcinol, S. & D.) dépend, en une certaine mesure des propriétés qu'il a de réduire la tension de l'urine. Comme les produits diurétiques, comprenant le bicarbonate de soude et de grandes quantités de fluides, augmentent la surface de tension de l'urine, ils ne devraient pas être employés pendant le traitement au CAPROKOL (Hexylresorcinol, S. & D.)

SHARP & DOHME

BALTIMORE, MD., U.S.A.

FRANK W. HORNER, Limitée

Distributeur par tout le Canada

48 St. Urbain Street,

MONTRÉAL, CANADA.

424 Wellington St. West,
Toronto, Ont.

Donald Block,
Winnipeg, Man.

2026 McDonald St.,
Vancouver, B. C.