

d'êtres, il a fallu appliquer à plusieurs reprises une révulsion très énergique. Lorsqu'on est sûr du diagnostic étiologique de l'hémorragie, il ne faut donc pas hésiter à revenir plusieurs fois à l'usage des vésicatoires ou des pointes de feu, soit sur la région hépatique, soit sur la région splénique, si une seule tentative ne réussit pas, et ne pas conclure à un échec de la révulsion si celle-ci ne procure pas du premier coup le résultat recherché.

H. B.

*Revue Générale de Méd.*

### Mise au monde de deux fœtus d'âge inégal

Par le Dr DEZSO KILHOR.

L'auteur a été appelé à donner des soins à une femme de 24 ans, qui accouchait pour la troisième fois et qui mit au monde, le 29 février 1892, à 9 h. du matin, une enfant à terme du sexe féminin. Presque immédiatement après expulsion d'un délivre de petite dimension. On fit la toilette de l'accouchée et on la replaça dans son lit; vers 4½ du soir, réveil des douleurs, très violentes. Le médecin appelé constate qu'il s'est formé un prolapsus utérin. Réduction de l'organe à l'aide du doigt: tamponnement du vagin avec de la gaze iodoformée. Les douleurs cessèrent. Le lendemain, à 9 heures, on enlève le tampon. A midi, nouveau réveil des douleurs; procidence d'une poche pédiculée, remplie d'un liquide clair. Extraction de cette poche qui adhérait à une masse villeuse (placenta). Après ouverture de la poche, on en retira un fœtus macéré du sexe masculin, d'une longueur de 17 centimètres. Le pourtour de la tête mesurait 15 centimètres. Suites de couches normales.

En somme, chez cette femme, l'utérus logeait deux fœtus, d'âges en apparence très différents, soit que deux ovules aient été fécondés à la même époque, mais que l'un des produits de conception étant venu à périr, l'autre ait continué à se développer en toute liberté, soit qu'il y ait eu superfétation, fécondation de deux ovules en deux époques différentes, cette seconde hypothèse étant beaucoup moins vraisemblable.

E. R.

*Revue Générale de Méd.*

### Traitement prophylactique de la goutte rénale

(POTAIN)

¼ Carbonate de lithine.....	0 gr. 20 centigrammes.
Acide benzoïque.....	0 gr. 05 —

Mélez pour un cachet, à prendre chaque jour, pendant deux septennaires pour prévenir l'accès de goutte rénale et maintenir l'intégrité