

FORMULAIRE.

Chaneroïde douloureux.—*Gross.*

P.—Hydrate de chloral.....	8 grains
Eau distillée.....	1 once
<i>College and Clinical Record.</i>	

Mixture expectorante.—*Hôpital Bellerue.*

P.—Carbonate d'ammoniaque	32 grains
Extrait fluide de sénega.....	
Extrait fluide de scille.....ââ	1 drachme
Teinture d'opium camphrée	6 "
Eau	4 "
Sirop de tolu..... q. s. pour faire	4 onces

M.—*Dose* : Une cuillerée à thé.—*Medical and Surgical Reporter.*

Prurit vulvaire.—*Athill.*

1^o P.

Acide carbolique.....	15 grains
Teinture d'opium.....	4 drachmes
Acide hydrocyanique dilué.....	2 "
Glycérine.....	4 "
Eau distillée.....	4 onces

M.—*En lotions.*—*Gazette de gynécologie.*

2^o P.—*Taylor.*

Feuilles de belladone.....	
Feuilles de jusquiame.....ââ	2 drachmes
Feuilles d'aconit	$\frac{1}{2}$ "
Acide acétique.....	1 once

M.—Faites macérer; filtrez et ajoutez parties égales de glycérine.

3^o P.—*Shoemaker.*

Onguent de nitrate de mercure.....	3 $\frac{1}{2}$ drachmes
Oxide rouge de mercure.....	20 grains
Axonge.....	4 drachmes

M.—

4^o P.—*Shoemaker.*

Acide carbolique.....	$\frac{1}{2}$ drachme
Chloral	1 "
Glycérine.....	1 "
Eau camphrée	2 $\frac{1}{2}$ onces

M.—*Kansas Medical Journal.*