

EXPÉRIENCES avec engrais dans des parcelles de betteraves fourragères et de navets de $\frac{1}{10}$ d'acre chacune—*Fin.*

N° de la parcelle.	Engrais appliqués chaque année.	RENDEMENT MOYEN DE SIX ANNÉES.		7 ^E SAISON, 1895. VARIÉTÉS.		RENDEMENT MOYEN DE SEPT ANNÉES.	
		Betteraves fourragères.	Navets.	Demi-parcelle est.	Demi-parcelle ouest.	Betteraves fourragères.	Navets.
				Betteraves fourragères. Mammoth longue rouge.	Navets. Rutabaga Imperial.		
Par acre.	Par acre.	Par acre.	Par acre.	Par acre.	Par acre.		
		tonn. lb.	tonn. lb.	tonn. lb.	tonn. lb.	tonn. lb.	tonn. lb.
18	Superphosphate minéral n° 1, 500 l. : muriate de potasse, 200 l. à l'acre.	12 1,898	10 391	10 1,620	6 1,580	12 1,287	9 1,418
19	Sulfate doublé de potasse et de magnésie, 300 liv. à l'acre en 1889 et 1890; remplacé chaque année depuis par muriate de potasse, 200 liv.; sang séché, 250 livres; superphosphate minéral n° 1, 500 livres à l'acre.....	14 478	9 1,821	15 1,860	12 280	14 961	10 458
20	Cendre de bois, non lessivée, 1,500 livres; sel ordinaire (chlorure de sodium), 300 livres à l'acre.....	14 1,969	9 1,922	14 1,730	8 300	14 1,935	9 1,405
21	Superphosphate minéral n° 2, 500 livres à l'acre	16 169	10 71	13 1,870	7 1,360	15 1,555	9 1,398

PARCELLES DE CAROTTES.

Depuis cinq ans nous avons ensemencé de carottes alternativement les deux moitiés des parcelles d'avoine, dans le but de débarrasser le terrain des mauvaises herbes. Ce travail a commencé en 1891. Ces parcelles sont ensemencées, tous les ans, de la variété Blanche courte améliorée. En 1895, les carottes occupaient la moitié est des parcelles. La graine mise en terre le 10 mai a levé le 27 mai. Les plantes ont levé si clair que le terrain a été de nouveau hersé et ensemencé le 12 juin. Les carottes ont levé le 24 juin et ont fait une pousse rapide et elles ont été arrachées le 21 octobre. La récolte, cette année-ci, ayant été semée si tard est considérablement au-dessous de la moyenne des trois années précédentes.