

tricle gauche, qu'il a observée dans tous ses cas, provient de la présence d'un élément toxique dans le sang et de l'obstruction de la circulation dans les corps de Malpighi, qui force le cœur gauche à faire plus de besogne.

Le terme glomérulo-néphrite doit être appliqué à ces cas seuls.

SECTION DE DERMATOLOGIE ET DE SYPHILIGRAPHIE.

Séance du 8 septembre.

Le docteur P. G. Unna, de Hambourg, lit un mémoire (avec préparations microscopiques) sur "L'eczéma seborrhoicum."

Les dénominations simples d'eczéma aigu et l'eczéma chronique ne sont pas d'une exactitude scientifique assez grande. Par exemple, il y a trois types distincts de l'eczéma de la face chez l'enfant : eczémas nerveux, tuberculeux et séborrhoïques ; le premier apparaît lors de la dentition, sur une peau absolument saine (les joues et après le front) ; la démangeaison est en proportion directe de la force de l'enfant et de l'épaisseur de l'épiderme. Les vésicules ressemblent parfois à celles de l'herpès zoster, mais la symétrie des lésions et leur tendance à la rechute empêchent de porter ce diagnostic.

Dans l'eczéma séborrhoïque, la peau n'était pas antérieurement saine ; il y a eu probablement une séborrhée du cuir chevelu quelques semaines après la naissance, qui s'est étendue à la partie supérieure de la figure. La démangeaison est moins violente. Un onguent composé d'ichthyol et de zinc, avec le bromure de potassium par la bouche, agit bien dans l'eczéma nerveux. Pour l'autre, le soufre et la résorcine doivent être employés.

Le docteur Unna considère que les séborrhées soi-disant sèches sont des inflammations chroniques de la peau et qu'il n'existe pas, en clinique, d'hypersécrétion des glandes sébacées qui constitue une séborrhée sèche, produite par un dépôt sur la surface cutanée de la substance sécrétée par ces glandes. Unna nomme eczéma séborrhoicum une affection dépendant d'altérations dans les glandes sudoripares, qui donnent lieu à la sécrétion de graisse par ces glandes. L'augmentation de graisse sur la peau indique une activité plus grande lorsqu'elle provient des glandes sébacées ; mais lorsque les glandes sudoripares fournissent de la graisse, c'est que leurs cellules endothéliales sont mortes.

Presque tous les eczémas séborrhoïques commencent sur le cuir chevelu ; on en décrit trois formes :

1^o L'eczéma commence comme catarrhe latent du cuir chevelu et passe par les périodes de formation squameuse et de sécheresse, pour se terminer en hyperhidrose huileuse.

2^o Les croûtes s'accumulent entre les cheveux et causent leur