âgés, séléreux, ou même chez des sujets plus jeunes dont les organes ont été touchés par ailleurs.

L'éclampsique n'est pas à l'abri de ces troubles, à cause de l'état de son foie et de ses reins. Il faut être prudent.

Sans doute il importe de calmer les crises, et le chloroforme agit bien et vite. Mais je m'insurge contre l'emploi exclusif et systématique de ce médicament dans l'éclampsie.

Le chloroforme n'agit, ici, que comme antispasmodique. C'est la seule raison de son emploi.

Il ne peut, en aucune façon, modifier l'état toxique du sang, la cause principale des accidents, c'est un pis-aller, en attendant mieux.

(g) *Le vératrum viride.*

Ce médicament a un effet merveilleux sur l'hypertension.

Le professeur De Cotret a été un des premiers à en vulgariser l'emploi dans l'éclampsie, à Montréal. Dans ses nombreux mémoires sur ce sujet, publiés dans l'Union Médicale, on remarque que l'action du vératrum est constante: il abaisse la pression artérielle et il diminue le nombre des pulsations cardiaques.

Comment agit-il?... C'est un point encore obscur. Une chose certaine c'est qu'il agit comme un poison sur le système musculaire strié. Son action sur le cœur est indépendante du système nerveux. Le vératrum agit directement sur la fibre musculaire, et avec une grande rapidité. Ainsi, vous injectez 20 gouttes d'extrait fluide sous la peau à une malade dont le pouls bat de 120 à 135, et $\frac{1}{2}$ heure après il est descendu à 60 ou 80...

Il abaisse aussi la température; il produit le relâchement du col de l'utérus; il provoque la diaphorèse et la diurèse; il favorise ainsi l'élimination des produits toxiques. On a dit aussi qu'il augmente la sécrétion biliaire.

En pratique, avec mon collègue De Cotret, j'en recommande l'emploi pourvu qu'on en surveille les effets. Car il arrive que le pouls descend quelquefois à 30, 40 pulsations. Il faut alors stimuler la malade avec la caféine en injections sous-cutanées à la dose des 0,25 à 0 gr. 50 centig. par jour.

La dose initiale est de 20 gouttes, puis 10 gouttes toutes les $\frac{1}{2}$ heures jusqu'à abaissement du pouls à 60 pulsations à la minute.