

I. Fam. des ALAUDIDES, *Alaudidæ*.

Première primaire très-courte ou manquant, bec court, conique, narines cachées par des plumes ou poils s'étendant sur les côtés du bec; tarsi scutellés par devant et par derrière; tertiaires dépassant les secondaires.

Cette famille, dans notre faune, se borne au genre suivant, qui ne renferme qu'une seule espèce.

Gen. ERÉMOPHILE. *Eremophila*. Boie.

Première primaire manquant; une tache noire en croissant sur la poitrine, avec une autre de même couleur sur les joues.

Erémophile cornue. *Eremophila cornuta*. Boie, *Alauda* Wils. *Alauda alpestris*, Wils.—Vulg. *Alouette de Virginie*; *Ortolan*; Angl. *The Sky-Lark*; *Shore Lark*. Longueur $7\frac{3}{4}$ pouces; ailes $4\frac{1}{2}$; queue $3\frac{1}{4}$; bec en dessus $\frac{1}{2}$ pouce. Dessus d'un brun viné, avec une strie brune sur chaque plume; pennes caudales du milieu, un croissant sur la gorge, une ligne s'étendant de la base du bec sur les côtés de la tête au dessous de l'œil, d'un beau noir; menton et gorge d'un beau jaune; dessous blanc, de même que l'extrémité des ailes et les pennes caudales extérieures, avec une bande frontale s'étendant en arrière de l'œil.

P. A. et C C. Ce gentil oiseau se voit au printemps et à l'automne, souvent associé au Plectrophane pour glaner de graines dans les champs. Il nous laisse à la fin d'Avril pour aller faire sa ponte plus au nord, au Labrador, dans le voisinage de la mer. La femelle pond de 4 à 5 œufs, assez gros, grisâtres et couverts de nombreuses taches, brunes et d'un bleu pâle.

Cette Alouette à la faculté de relever deux plume sur le sommet de la tête qui la font paraître comme cornue; de là son nom spécifique. Après la mort, il est guère facile de reconnaître ces espèces de cornes.

II. Fam. des PARIDES, *Paridæ*.

Première primaire plus courte que la seconde; bec assez court, droit, à sommet large et arrondi; narines basales cachées par des plumes ou soies; tarsi distinctement scutellés.