

Habituellement, lorsqu'un épanchement est unilatéral, l'expansion thoracique du côté opposé supplée dans une certaine mesure au rétrécissement du champ respiratoire dans le poumon comprimé. Il ne pouvait pas en être ainsi chez cette femme puisque le poumon gauche est encapsulé dans une épaisse coque symphysaire et que de plus la cage thoracique semble en quelque sorte ankylosée de ce côté. Laënnec, qui a le premier décrit la rétraction thoracique consécutive à la pleurésie chronique (*Traité de l'auscultation médiate*, édition de la faculté de médecine page 570) signale un cas très analogue à celui que je viens de rapporter.

Il s'agissait d'un tuberculeux présentant un rétrécissement de la poitrine à gauche et qui fut atteint de pleurésie droite consécutive. « La respiration devint dès lors très gênée. » On commença à entendre le retour de la respiration à la partie inférieure du poumon gauche où elle n'était pas perceptible auparavant.

Chez notre malade, nous ne connaissons pas l'état de la respiration dans le poumon gauche avant son entrée et nous ignorons dans quelle mesure le parenchyme pulmonaire a pu devenir plus perméable. La résorption de l'épanchement à droite nous permettra de suivre les modifications du murmure vésiculaire qui apparaîtront dans le poumon gauche.

Cette femme dont les deux plèvres sont lésées, est-elle tuberculeuse ? Rien dans les signes fournis par l'auscultation ni dans les antécédents ne permet de l'affirmer.—*Journal de clinique et de thérapeutique infantiles*.

Traitement de la typhlite et de la pérityphlite infantiles.
Traitement de Bouchard modifié pour l'enfant par LeGendre.
 —1° Calmer la douleur : application d'une couche épaisse de pommade.

R Onguent mercuriel double..... 30 grm.
 Extrait de belladone..... 4
 Extrait d'opium..... 1
 F. S. A.

Recouverte d'un cataplasme très chaud.

Donner aux enfants déjà grands un peu d'opium à l'intérieur.

2° Irrigations antiseptiques, faites très lentement, deux fois par jour, avec une quantité d'eau à 38° variable selon l'âge :

R Borate de soude..... 2 grm.
 Eau 1 lit.

M.—Dans laquelle on ajoutera une ou deux cuillerées à café du mélange :

R Teinture de benjoin }
 Alcool camphré..... } aa 30 grm.

M.—

3° Repos absolu.