

typhique apparemment grave ; la langue devient sèche, la prostration considérable, la rate congestionnée, etc., mais le plus souvent la température est peu élevée ou fait complètement défaut.

Sous le traitement diététique et avec une médication hépatique et tonique, tous ces symptômes s'amendent rapidement. L'on recommandera un repos absolu et une diète au lait stérilisé ou homogénéisé et des bouillies faites avec la crème de riz et le babeurre.

*Comme antiseptique intestinal et stimulant hépatique :*

Calomel .....	16 milligr. (1/4 de grain)
Menthol .....	10 milligr. (1/6 de grain)
Bicarbonat de soude.....	12 centigr. (2 grains)
Eucalyptol .....	3 gouttes

pour une capsule ou pour une poudre (chez l'enfant), à prendre le soir trois heures après le lait, durant deux ou trois jours.

Pour combattre la vaso-dilatation et l'extravasation sanguine l'on prescrira alternativement tous les deux jours l'ergotine 12 à 24 centigr. (2 à 4 grains) et l'hydrastis canadensis 5 à 30 gouttes d'extrait fluide, deux par jour.

*Comme tonique :*

3 à 10 gouttes de fer colloïdal (fer dialysé), trois fois par jour.

Ou :

Perchlorure de fer .....	5 à 20 gouttes
Glycérine .....	30 grammes (1 once)
Sirop de menthe .....	60 grammes (2 onces)

Une cuillerée à thé avec un peu d'eau trois fois par jour après les repas.

Ou :

Teinture de noix vomique..	60 gouttes
Glycérine .....	30 grammes (1 once)
Sirop de quinquina .....	90 grammes (3 onces)