

un peu jaunâtres, le stigma jaune. Pattes jaunes, les hanches et les trochantins noirs, les cuisses brun-roussâtre, les jambes avec une tache à l'extrémité en dedans, brun-roussâtre, de même que les tarses. Abdomen fort, finement ponctué, les sutures de la base un peu enfoncées, le 1er segment plus petit avec une tache ronde de chaque côté, le 2e avec une paire de taches latérales en pointe vers la ligne médiane du dos, 3, 4 et 5 avec une ligne jaune apicale subinterrompue au milieu; l'extrémité noire.

Bien distinct par les 2 taches rondes de son 1er segment abdominal.

3. Philanthe bilunulé. *Philanthus bilunatus*, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. V. p. 97.

♀ — Long. .36 pce. Noir, la face, les mandibules, le collier, le post-écusson, une tache au-dessous des ailes, les pattes avec des fascies sur les segments abdominaux, jaune. Le chaperon avec ses pièces latérales remontant au dedans des yeux et une tache frontale au dessus des antennes, jaune, les sutures noires. Antennes noires, les articles 1, 3 et 4 jaunes en dessous. Tête large, transversale, le collier avec une ligne jaune interrompue au milieu, les écailles alaires brunes avec une tache jaune, une autre tache jaune transverse au dessous des ailes antérieures. Métathorax poli, avec un large sillon au milieu. Ailes fuligineuses-jaunâtres, le costa jaune. Pattes jaunes y compris les hanches, les trochantins et les cuisses excepté à l'extrémité. Abdomen poli, brillant, les sutures des 2e et 3e segments profondes, le 1er segment avec une petite ligne jaune transverse de chaque côté, le 2e avec une large tache subovale de chaque côté, les 3e, 4e et 5e avec une fascie continue, échancrée supérieurement de chaque côté du milieu, le reste sans tache.

Un seul spécimen ♀ capturé sur le Petit-Cap (S. Joachim), par M. l'abbé Huart.

2. Gen. CERCÉRIDE. *Cerceris*, Latr.

Tête courte et large; 3 ocelles en triangle sur le vertex; chaperon à peu près aussi long que large. Prothorax court, annulaire. Ailes avec une cellule radiale arrondie à son extrémité qui s'écarte légèrement de la côte; 3 cubitales fermées, les 2e et 3e chacune avec une nervure récurrente, la 2e plus petite, triangulaire, pétiolée. Abdomen à sutures fortement resserrées, le premier segment