

2 Gen. VIREO, *Vireo*, Vieillot.

Bec court, fort, droit, très comprimé jusqu'à la pointe qui est brusquement réfléchi ; soies courtes et faibles ; ailes assez longues, pointues ; queue un peu courte, presque carrée ; tarses plus longs que le doigt médian et non-écailleux en arrière.

Ce genre, dans notre faune, ne comprend que deux espèces :

1. **Le Viréo Gris.** *Vireo gilvus*, Bonap. *Muscicapa gilva*, Vieillot. *M. melodia*, Wils.—Angl. *The Warbling Vireo* ; *Warbling greenlet*.—Longueur $5\frac{1}{2}$; ailes 3 pouces. Parties supérieures olive-cendré, lores bruns, avec une ligne blanche partant de la base de la mandibule supérieure et se prolongeant jusque derrière l'œil, le dessous de l'œil blanchâtre ; côtés de la tête brun-jaunâtre ; dessous blanc avec jaune pâle sur la poitrine et les côtés ; 1ère primaire ne dépassant pas le quart de la 2e.

P. et A C. Ce Viréo nous arrive en Mai et se montre assez souvent dans les jardins et les vergers où il fait la chasse aux insectes. Il niche souvent dans les grands arbres, pond 4 œufs blancs, maculés de rouge-brun au gros bout.

2. **Le Viréo à front jaune.** *Vireo flavifrons*, Vieillot. *Muscicapa sylvicola*, Wils.—Angl. *Yellow throated Vireo*.—Longueur 6 ; ailes $3\frac{1}{4}$ pouces. Dessus, depuis le bec jusqu'au milieu du dos, côtés de tête, cou et la partie supérieure de la poitrine olive-verdâtre ; dessous, jusqu'au milieu du ventre avec un cercle autour des yeux, jaune soufre, le reste blanc ; et les autres parties du dessus bleu-cendré teint de vert ; deux bandes blanches sur les ailes ; tertiaires liserées de blanc, les autres pennes de vert ; pennes caudales extérieures bordées de blanc jaunâtre.

R R. On doute même s'il visite parfois Québec, car il est assez rare encore dans Ontario ; il appartient à des régions encore plus méridionales. Il place son nid dans les fourches des grands arbres et pond 4 œufs d'un blanc pur avec quelques très petites taches de brun.

(A continuer).