

commerce ; donner aux pieds-mères, qui sont toujours pris
culture. Parmi les plantes les plus développées et les plus
petites que vigoureuses, sont assez nombreux : on ne leur
ent rare- laisse que les ramifications qui sont entrées les
nt. premières en floraison et on supprime tous les
rse, sont bourgeons à fleurs secondaires, en ne laissant
t la cultu- produire qu'une cinquantaine de capsules sur
essais. Il chaque pied. On assure ainsi la production d'une
de s'en graine saine, entière et parfaitement développée
à l'époque de sa maturité. On dépouille les pieds-
er de la mères des trois ou quatre feuilles les plus basses
l'on veut de la tige et qui sont, en général, impropres à la
e graines végétation. On leur enlève les bourgeons qui se
n établie. développent à l'aisselle des feuilles, ainsi que
planta- ceux à fleurs secondaires au fur et à mesure qu'ils
nt on a se développent.

A l'époque de la récolte du tabac, on les
débarrasse de toutes leurs feuilles et l'on met à
chacun de bons tuteurs auxquels on les assujet-
tit avec soin, afin de leur permettre de continuer
à mûrir leurs graines.

On reconnaît ordinairement que la graine
est mûre lorsque les capsules qui la contiennent
sont toutes tournées au noir ; il est alors temps
de la récolter. On coupe les plantes à la base