

*Tænia* du moineau, *Tænia passeris*.

Un peu épais; les articulations très-courtes; la partie postérieure sillonnée et frangée.

*Pallas*, Beytre. tab. 3. fig. 29, 30.

Se trouve dans les intestins du moineau et du charbonnet.

*Tænia* de l'hirondelle, *Tænia hirundinis*.

Capillaire; le cou simple; les articulations tronquées et infandibuliformes.

Se trouve dans les intestins de l'hirondelle.

*Tænia* noduleux, *Tænia nodulosa*.

Les articulations noduleuses, ponctuées dans leur milieu; la tête à deux lèvres, chacune avec une double épine à trois branches.

*Goeze*, Eingew. tab. 34. fig. 366. *Pallas*, Beytre. tab. 3. fig. 32, 33.

Se trouve dans la vésicule du fiel des perches, des brochets, et des anguilles.

*Tænia* à tête sans crochets.*Tænia* large, *Tænia lata*.

Blanc; les articulations très-courtes, noueuses dans leur milieu; les stigmates solitaires et latéraux.

*Pallas*, Beytre. 1. tab. 3. fig. 17, 18, 19. *Bonnet*, Mém. des ac. étrang. 1. tab. 15, 16. *Goeze*, Eingew. tab. 21. fig. 8. *Batsch*, Bandw. fig. 51, 66.

Se trouve dans les intestins de l'homme, en Suisse et en Russie, plus fréquemment qu'ailleurs; a de 18 à 20 pieds de long.

*Tænia* denté, *Tænia dentata*.

La tête pointue, sessile; les plus grandes articulations. I.