Dose: Une cuillerée à thé à 10 hrs a.m. et à 9 hrs p.m.,

dans un verre à vin d'eau froide.

Je débutais par une dose presque timide afin d'éviter les désordres que produit quelquefois ce médicament, tels que céphalalgie, nausée, vomissements, etc., etc.

Pendant trois ou quatre jours, il n'y cut aucune modification sensible dans l'état de mon malade. Je n'en continuai pas

moins le traitement.

Vers le cinquième ou sixième jour de ce traitement, le pouls se releva un peu; je comptai 36 pulsations à la minute,

avec un peu plus de régularité.

Environ huit jours plus tard, comptant sur le suétudisme et la tolérance parfaite du remède, j'augmentai la dose à deux gouttes toutes les huit heures. Le pouls radial donna bientôt 50 pulsations à la minute avec régularité presque parfaite. La respiration devint facile, la sécrétion urinaire abondante, le sommeil et la digestion parfaite; l'hydropisie céda rapidement à l'efficacité du traitement.

L'asystolie était vaincue, la compensation rétablie et le malade sauvé. Je continuai ce traitement jusqu'au 10 mai. La

santé de M. B... s'est maintenue parfaite depuis.

St. Eustache, 8 août 1882.

## Considérations pratiques sur le diagnostic et le traitement de quelques maladies des yeux,

par A. A. FOUCHER, M.D., professeur d'Ophthalmologie à l'Université Laval (Montréal). (1)

## Conjonctivite granuleuse.

Parmi les maladies des yeux que l'on rencontre le plus souvent, et qu'il importe de bien connaître, on peut citer, en première ligne, la conjonctivite granuleuse. Cette affection a sou siège presque exclusivement sur la conjonctive palpébrale supérieure et détermine, à la longue, des complications cor-

<sup>(1)</sup> Voir nos livraisons de Juillet et Août.