

Hystérie. Perversion des fonctions nerveuses.	Irritation cérébrale par excitation extrême ; déran- gements sexuels ; méno- pause ; commotion de la tête ; convulsion de l'épine ; puberté ; émotion contrainte ; dépla- cement de l'utérus ; troubles digestifs.	Position horizontale ; affusions froides ; pression abdominale ; compression des c. aires ; nitrite d'amyle ou chloroforme en inhalation ; teinture de musc, valériane.
Ivresse. Empoisonnement des centres nerveux par l'alcool.	Prédisposantes : Hérédité. suite dilatée, faiblesse, insensibilité déterminantes : Abus des liqueurs, alcool ou ses sub- stances (fusel oil), dans les li- vite ; peau froide ; paralysie ten- poaire ; miction involontaire ; odeur de liqueur ; température basse.	Position horizontale, la tête élevée ; affusions froides ; émétique de zinc ou de moutarde ; pompe à estomac ; lavement de sel ou de térébenthine ; café fort ; vinaigre, solution d'acétate d'ammoniaque ; pilocarpine, gr. 5 ; ou strychnine gr. 1/30 ; ou caféine gr. ii hypodermiquement.
Syncope. Manque de sang, tige, crainte ou douleur extrême, opération chirur- gicale, maladies du cœur.	Pupilles dilatées, transpiration vis- queuse froide, rigide, respiration su- perficielle presque impalpable, in- sensibilité partielle ou totale, attaque subite de courte durée ; extrémités froides, membres flasques, vomisse- ments. Dans la syncope hystérique, pouls normal.	Position horizontale, la tête basse ; affusions froides, lavement stimulant ; frictions, inhalation d'ammoniaque ; sinapième, embrocation de téré- benthine sur la région précordiale, nitro-glycerine gr. 1/100 ; galvanisme, teinture de sumpul (m v) ; hydrobromure de quinine gr. iv dans de l'eau chaude hypodermiquement ; respiration artifi- cielle. Dans les cas extrêmes, la trachéotomie.