

tarses 1.58 ; commissure 1.80. Tête et haut du cou d'un violet bleuâtre, quelquefois à reflets verdâtres ou purpurins. Une tache blanche en avant de chaque œil occupant tout le côté du bec et s'avancant en pointe sur le front. Dessous et bas du cou, blanc. Couvertures alaires blanches, traversées au milieu par une barre noire. Scapulaires antérieures blanches, bordées extérieurement de noir, les postérieures noires avec une strie centrale blanche. Le reste du dessus, noir. Longues plumes des flancs blanches, terminées et bordées en dessus de noir.

AR.—Sa plus forte taille et la marque blanche en triangle à la base du bec le distingue particulièrement du précédent. Quoique un peu moins commun que le précédent, on le rencontre assez fréquemment en automne dans le bas du fleuve. Mêmes habitudes que chez le précédent.

**3. Le Bucéphale Blanchatre.** *Bucephala albeola*, Baird ; *Anas Bucephala*, Lin. *Clangula alb.* Jenyns.—Vulg. *Le petit canard gross-tête* ; Angl. *Butter Ball* ; *Buffle Head*.—Longueur 15 pouces ; ailes 6.65 ; tarses 1.25 ; commissure 1.44. Bec bleu. Tête et haut du cou d'un brun foncé, l'espace en avant des yeux et les côtés du cou d'une riche couleur verte, à reflets purpurins ; une large tache de chaque côté de la tête, le bas du cou tout autour, le dessous, les couvertures alaires excepté les petites, une grande partie des secondaires et les scapulaires, blanc ; les dernières étroitement bordées de noir en dehors. Le reste du dessus noir. Les couvertures alaires inférieures d'un brun sale, plus ou moins largement terminées de blanc.

PA. et C.—Ce canard se rencontre fréquemment sur notre fleuve dans ses migrations de l'automne et du printemps. C'est un excellent nageur, et les chasseurs connaissent combien souvent cette faculté le dérobe à leurs coups. Il niche dans le Nord du Continent, plaçant son nid garni de 5 à 6 œufs, dans le trou de quelque vieux tronc d'arbre.

#### 4. Gen. HISTRION. *Histrionicus*, Lesson.

Bec très petit, s'amincissant jusqu'au bout qui est arrondi et entièrement occupé par le crochet. Narines un peu en arrière du milieu du bec. Un angle bien marqué au coin postéro-supérieur. Plumes du front s'étendant peu en avant. Un lobe membraneux à la base du bec. Tertiaires