

14. *Strongylogaster hanches-pâles*. *Strongylogaster pallicoxus*, nov. sp.



Fig. 2.



Fig. 3.




Fig. 4.



Fig. 5.

♀ — Long. .30 pec. Noir avec les pattes et une bande à l'abdomen, jaune-miel. Le chaperon, le labre, les mandibules, les palpes, les écailles alaires, les bords supérieurs du prothorax, toutes les hanches avec les trochanters, blanc. Chaperon fortement échancré; tête très grosse en arrière des yeux. Ailes hyalines, le costa avec la base du stigma pâles. Pattes d'un beau jaune miel avec un petit anneau au sommet des cuisses, noir, les tarses postérieurs bruns à l'extrémité; les hanches et les trochanters blancs. Abdomen noir, élargi vers l'extrémité, avec une large tache roussâtre couvrant les segments 2, 3 et 4, une semblable tache lui correspondant sous le ventre.

Fig. 2—Type des ailes inférieures des *A'lantus*, *Strongylogaster* et *Tenthredo*; la cellule lancéolée *a* n'atteint pas le bord de l'aile, et les cellules extérieures ne sont pas fermées par une nervure.

Fig. 3—Aile inférieure des *Strongylogaster mellosus*, *apicalis*, *epicera*, et de *Perineura*, Hartig.

Fig. 4 —Aile inférieure du *Strongylogaster pinguis* ♂; la cellule lancéolée *a* atteint le bord de l'aile, les cellules extérieures sont fermées par une nervure un peu en dedans du bord de l'aile.

Fig. 5. Aile inférieure du *Strongylogaster abnormis* ♀, Prov.; la cellule lancéolée *a* n'atteint pas le bord de l'aile, et porte la nervure qui sépare la cellule immédiatement au dessus, sur un appendice à son extrémité.