

274 HISTOIRE NATURELLE

Fasciole de l'érioce, *Fasciola eriocis*.

Elliptique, transparente; le milieu roux.

Muller, Zool. Dan. 2. tab. 72. fig. 4, 7. Encycl. pl. 80. fig. 3, 4.

Se trouve dans les intestins de l'érioce.

Fasciole du fario, *Fasciola farionis*.

Oblongue, aplatie, antérieurement bordée par six lobes égaux.

Muller, Zool. Dan. 2. tab. 72. fig. 1, 3. Encycl. pl. 80. fig. 1, 2.

Se trouve dans les intestins de la truite fario.

Fasciole de la truite, *Fasciola trutta*.

Oblongue, avec deux taches blanches luisantes, orbitaire, derrière le suçoir inférieur.

Froelich, Naturf. 24. tab. 4. fig. 16, 17.

Se trouve dans les intestins de la truite commune.

Fasciole de l'ombre, *Fasciola umbla*.

Oblongue, aplatie; le cou aigu, rétractile.

Se trouve dans l'ombre chevalier, espèce de saumon.

Fasciole du brochet, *Fasciola lucii*.

Lancéolée; le bord applati, crénelé; le cou allongé, cylindrique.

Muller, Zool. Dan. 1. tab. 30. fig. 72, et tab. 78. fig. 6, 8. Encycl. pl. 79. fig. 20, 22.

Se trouve dans l'œsophage, et le ventricule du brochet.

Fasciole de la brème, *Fasciola brama*.

Allongée, cylindrique; la partie postérieure atténuée, obtuse; le cou cylindrique, un peu recourbé.

Muller, Zool. Dan. tab. 30. fig. 6. Encycl. pl. 79. fig. 19.

Se trouve dans les intestins de la brème.