

Sirop simple	30 gr.
Acide chlorhydrique	1 gr.
Vin de rhubarbe	100 gr.

Les laxatifs sont d'autant plus indiqués qu'il y a souvent atonie intestinale. On donnera assez souvent de la magnésie calcinée, du sulfate de soude, du calomel—à petite dose—ou mieux du naphthol phtaléine associé à la phénolphthaléine, 0.20 de chaque—leur action est douce et prolongée.

De temps en temps, on fait faire des lavements froids, qui ont une action aseptique et mécanique.

La diarrhée, moins fréquente, et due à l'insuffisance de la sécrétion chlorhydrique qui est un excellent antiseptique gastrique et intestinal.

Ils cèdent généralement à l'emploi de l'acide chlorhydrique et de la pepsine, du calomel, de la levure de bière.

Les fermentations se produisent dans le segment inférieur de l'intestin, irritent la muqueuse et produisent la diarrhée.

T. hygiénique.—C'est une partie importante. Cette dyspepsie survient souvent chez les affaiblis et les surmenés. Il faudra stimuler l'organisme tout entier, conseiller l'exercice, le sport sans aller à la fatigue. Les repas seront pris régulièrement, lentement et seront suivis d'une infusion chaude. Je conseille rarement le régime lacté, laissant les malades s'alimenter suivant leurs préférences, pourvu que l'on évite les mets trop lourds. Jamais de vin pur, pas de bière.

Formes mixtes: Vous rencontrerez quelques fois des malades qui ont la pesanteur de l'hypochlorhydrie, après les repas et qui, 3 heures après, accusent la douleur de l'hyperchlorhydrie. Il semble que la sécrétion ne se fasse plus aux heures où elle devrait se faire. Vous donnerez l'acide après les repas et les alcalins dans l'intervalle des repas.

DYSPEPSIE HYPERCHLORHYDRIQUE.

Quelques auteurs ne veulent pas croire à une dyspepsie hyperchlorhydrique simple. Cependant c'est la classification de Mathieu et Huchard, et je crois que l'hyperchlorhydrie mérite un chapitre spécial.

Le principal symptôme est la douleur intermittente. Elle survient 2 à 3 heures après le repas. C'est une brûlure au creux épigastrique, s'irradiant dans le dos et dans les côtés du thorax. Elle est calmée par l'ingestion d'aliments solides ou liquides, ou par les médicaments alcalins.

Indications thérapeutiques: Elles consistent à diminuer l'abondance de la sécrétion gastrique et à neutraliser l'excès d'acide qu'elle contient.

1°—*Diminuer la sécrétion du suc gastrique:*—Ce qu'il faut d'abord, c'est de diminuer au minimum les excitations de la muqueuse gastrique.