

TUMEURS DE LA REGION SOUS-HEPATHIQUE.⁽¹⁾

"TROIS OBSERVATIONS CLINIQUES".

Dr P. C. DAGNEAU,

professeur de clinique chirurgicale à l'Hôtel-Dieu.

Les trois malades dont je veux vous présenter aujourd'hui les observations n'ont rien d'extraordinaire ni de rare; seulement, ils réunissent en un petit groupe, que le hasard de la clinique a réuni en même temps, les trois affections principales qui donnent lieu à des tumeurs dans la région sous costale droite, non pas que seuls les organes dont il sera question peuvent donner lieu à la présence de masses analogues à celles que je vous décrirai dans un instant, mais le colon transverse, le rein et le foie sont bien les trois sources les plus fréquentes des affections de cet ordre.

La première malade qui nous intéresse présente l'observation suivante: Melle B. 45 ans, se plaint de douleurs dans la région sous-hépatique depuis le commencement de l'année 1918; elle a dans cette région des douleurs presque constantes, avec certaines exacerbations qui ont le caractère de crises, pas très intenses et sans grande durée. Cependant des troubles d'estomac assez complexes, sans grande précision cependant, accompagnent cet état douloureux; ces crises accompagnées quelquefois de nausées, rarement de vomissements, ne présentent aucune irradiation classique, ni symptômes accessoires qui soient de nature à faire fixer un diagnostic d'une façon bien précise.

En juin 1919, après avoir posé un diagnostic de lithiase biliaire, un chirurgien lui fait une laparotomie droite et découvre au cours de son exploration des traces d'ulcère du duodénum, sans lui faire cependant d'intervention sur cet organe.

Après sa convalescence, un traitement alcalin lui procure quelques soulagements, mais en décembre 1921, à la suite de la répétition des mêmes accidents, un autre chirurgien lui fait une gastro-entérostomie dont la malade se remet très bien et conserve une amélioration presque complète de tous ses symptômes antérieurs; la malade engraisse et reprend ses occupations.

En septembre 1923, la malade commence à se plaindre de certains troubles intestinaux, alternatives de diarrhée et de constipation, douleurs

(1)—Communication faite à la Société Médicale, le 22 février 1923.