

cathétérisme doit être effectué une fois par jour. si l'urine est altérée, on le répétera plus fréquemment. Il est urgent que le malade apprenne à se sonder lui-même ; il doit le faire debout, à l'aide d'un instrument flexible en gomme. L'auteur recommande, lorsque la vessie est accoutumée depuis longtemps à renfermer toujours de l'urine, de ne pas la vider complètement de suite, il faut l'habituer progressivement à revenir sur elle-même, et pratiquer un cathétérisme évacuateur imparfait d'abord, en sorte qu'il faille quinze jours ou trois semaines pour arriver au moment où la vessie sera vidée complètement à chaque passage de la sonde.

Contre l'atonie musculaire de la vessie, l'auteur conseille des affusions froides brusques sur le ventre, deux ou trois fois par jour. Des injections froides intravésicales d'abord tous les deux jours, plus tard tous les jours. On pourra essayer aussi l'électricité, la strychnine, le seigle ergoté, et y joindre un régime tonique.

La cystite chronique, si fréquente dans ces cas, se trouve souvent fort bien de lavages de la vessie une fois par jour avec de l'eau à 37°, 7 ; lorsque l'eau sort claire, sans pus ni mucus, on devra faire tous les deux ou trois jours une injection faible, astringente.

On peut encore essayer de l'application tous les deux jours sur le bas-ventre, d'un cataplasme de graines de lin chaud sumpoudré de farine de moutarde.

Un moyen encore fort utile, ce sont les bains de siège chauds, ils ne doivent pas durer plus de six ou huit minutes, et l'eau doit être à la température de 38° à 40°, le malade, bien essuyé, doit ensuite rester au lit. On peut, si l'on craint de débilitier le sujet, remplacer le bain par l'usage de lavages avec de l'eau très-chaude dans un bidet.

C'est ici que peuvent se placer nombre de médicaments internes, surtout employés sous forme de tisanes.

« On peut agir, dit Thompson, sur une sécrétion chronique de la muqueuse vésicale, très-abondante, avec atonie des parois, sans inflammation, avec l'ava ursi, le polygala, le pareira brava,

Feuilles d'ava ursi.....	} aa. 60 gram. ʒii
Racines de pareira brava.....	
Eau.....	.1500 — lbiii ʒxii

Faire bouillir, réduire à l' litre, filtrer ; en prendre quatre fois par jour 60 à 90 grammes

Quand les envies d'uriner sont fréquentes et qu'il n'y a pas de symptômes aigus, le chiendent et l'alechimille en tisane sont excellents.

Lorsqu'il y a de l'inflammation chronique, douleur au-dessus du pubis, grande sensibilité au passage de la sonde, c'est alors que conviennent les huiles volatiles qui sont excrétées par le rein, ce qu'il y a de meilleur c'est l'infusion de Bucco.