

Herrenschneider insiste fortement sur l'abaissement marqué de la pression sanguine qui suit immédiatement l'amputation des seins et s'associa à la cessation immédiate des convulsions. L'amputation amena la chute de la pression, et la chute de la pression provoqua selon lui la disparition des crises, lesquelles étaient devenues très violentes."

Le journal anglais s'abstient de tout commentaire, et vraiment est-il besoin d'en faire?

PHTISIOTHÉRAPIE

Traitement de la tuberculose pulmonaire par le sérum de Marmorek.

— Ch. MONGOUR. — *Journal de méd. de Bordeaux*, 15 juillet 1911.

M. Mongour a traité, en une année, environ 100 cas de tuberculose pulmonaire par le sérum de Marmorek. — Son opinion peut se résumer ainsi qu'il suit :

1° Tuberculoses pulmonaires chroniques à lésions des sommets ouvertes ou fermées, avec apyrexie, conservation relative de l'embonpoint, aptitude au travail: pas d'amélioration nette; maintien du statu quo. — (Dans les tuberculoses chroniques non pulmonaires, ostéites, adénopathies, fistules à l'anus, arthrities fongueuses, pas d'amélioration sensible).

2°—Tuberculose pulmonaire aiguë avec cavernes (5 malades): aucun résultat favorable.

3°—Tuberculose pulmonaire aiguë au second degré, avec lésions déjà avancées, uni ou bilatérales, avec hyperthermie, tachycardie et hypertension: amélioration considérable 2 fois sur 3 et même 2 fois sur 4 si les lésions sont moindres.

L'expérience porte sur 37 malades dont beaucoup, traités dans les hôpitaux, n'ont pas bénéficié de la cure hygiéno-diététique. L'adjonction de cette cure à la sérothérapie rend les succès bien rares chez les sujets qui n'ont encore que des lésions discrètes le ramollissement.

Dans les quinze premiers jours du traitement, la fièvre tombe, la tachycardie et l'hypertension se modèrent, le poids augmente, l'expectoration est moins abondante et plus fluide, les bacilles y