

Dans les cas où l'enfant est très agité, lorsqu'il a des selles fréquentes, verdâtres, mais peu abondantes (en tant que quantité à chaque évacuation), lorsque le ventre est ballonné, nous commençons par prescrire un purgatif. La majorité des auteurs recommande alors le calomel à la dose de 0 gr. 03 à 0 gr. 05. pur ou additionné de magnésie calcinée ; toutefois on obtient de bons résultats également avec de l'huile de ricin à la dose d'une demi ou d'une cuillerée à café. Après le purgatif on donne soit du bi-carbonate de soude à 10/0, soit une solution d'acide chlorhydrique à 10/0 dans une potion.

R. Eau de menthe.....
Eau distillée..... } 44 25 gr.
Bicarbonate de soude 50 centigr.
Une cuillerée à café toutes les deux heures.

ou

R. Infusion de racines de valériane..... 45 gr.
Acide chlorhydrique dilué 5 centigr.
Sirop simple..... 5 gr.

Comme la précédente.

Le bicarbonate de soude est principalement indiqué dans l'excès d'acidité du tractus gastro-intestinal (les évacuations irritent la peau dans le voisinage de l'anus, renvois et régurgitations très acides) ; l'acide chlorhydrique se prescrit principalement lorsque dans les vomissements le lait est peu caillé.

Si les coliques sont très fréquentes, il est utile d'ajouter l'une ou l'autre des deux potions d'un peu d'opium sous la forme, par exemple, de teinture d'opium simple (1), en calculant de telle façon qu'il n'y ait, par jour, pas plus d'une goutte par année d'âge (enfant de six mois, une demi goutte) ; pour les enfants de moins de six mois il vaut mieux prendre l'elixir parégorique qui est vingt fois plus faible que la teinture précédente et par suite plus facile à doser. On peut prescrire *pro die* deux gouttes par mois d'âge de l'enfant, par exemple :

R. Eau distillée
Eau de fenouil } 44 25 gr.
Bicarbonate de soude 50 centigr.

(1) Extrait thébaïque.