

Arbor conciliorum. *Rumph amb.* 3. p. 142. t. 91. 92.
mala.

Areala. *Rheed. mal.* 1. p. 47. t. 27.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 538.

Heilige Feige. W.

Habitat in India orientali. h. (v. v.)

Fructus *pisiformes*, axillares, bini sessiles. Calyx inferus triphyllus.

* 13. *FICUS auriculata.*

F. foliis cordatis acuminatis subserratis tomentosis, receptaculis turbinatis auriculatis. W.

F. foliis cordatis acuminatis, fructu auriculato, racemo terminali. *Loureiro coch.* 2. p. 819.

Ohr - Feige. W.

Habitat in Cochinchina. h.

Arbor magna ramis obliquis. Folia cordata acuminata subserrata tomentosa magna sparsa petiolata. Fructus turbinatus bipollicaris laevis intus et extus ruber, racemis congestis erectis terminalibus, calycibus receptaculi triphyllis persistentibus. Praeter apicem pertusum generis proprium, ad humeros fructus patent 4 foramina inter se distantia cartilagine quadam prominente circumvallata, auriculas repraesentantia. *Loureiro l. c.*

14. *FICUS benghalensis.*

F. foliis ovatis integerrimis obtusissimis basi rotundatis subcordatis quinquenerviis, receptaculis globosis geminatis sessilibus calyculatis. W.

F. foliis ovatis integerrimis obtusis, caule inferne radicato. *Hort. cliff.* 471. *Amoen. acad.* 1. p. 29. *Roy. lugdb.* 212. *Trew. chret.* 50. *Mill. diet.* n. 4.

F. foliis ovatis integerrimis glabris obtusiusculis basi quinquenerviis, ramis deflexis. *Ait. Kew.* 3. p. 450.

F. americana, latiore folio venoso. *Pluk. phyt.* 178. f. 1.

F. benghalensis, folio subrotundo, fructu orbiculato. *Comm. hort.* 1. p. 119. t. 62.

Peralu. Rheed. mal. 1. p. 49. t. 28.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 540. t. 17. f. 2.