

CHAPITRE IX

Comment diriger l'incubation.—Régularisation de la température.—Retournement des oeufs.—Refroidissement des oeufs.—Mirage.—Utilité du mirage.—Précaution à prendre lors du mirage.—Second mirage.—Eclosion.—Méthode Gaulin

MANIÈRE DE PLACER LES ŒUFS DANS LE TIROIR.—Les œufs doivent être placés dans le tiroir dans leur position naturelle, c'est-à-dire sur le côté, et non pas le petit ou le gros bout en haut. (D'après M. F. Goujon, un auteur français, le gros bout doit être un peu relevé. Le germe ayant toujours tendance à monter, la tête du poussin se formera dans ce gros bout, et l'éclosion sera moins pénible.) Il n'est pas nécessaire de placer les œufs en rangs.

RÉGULARISATION DE LA TEMPÉRATURE.—Dès que les œufs sont placés dans la couveuse, le thermomètre descendra naturellement au-dessous du degré qu'il marquait. Cela est dû au fait que ces œufs sont froids. Il ne faut pas pour cela hausser la flamme de la lampe. Au contraire, il vaut souvent mieux la baisser de manière à obtenir graduellement vers le soir, une température de 95° à 99°.

Les cinq premiers jours, le thermomètre devra marquer 101° à 102°; les dix jours suivants 102° à 102½°, et enfin 102½° à 103°, jusqu'à ce que les œufs commencent à "bécher".

Pendant l'éclosion la température devra être de 103° à 104½°, mais aussitôt l'éclosion terminée on fera baisser le thermomètre jusqu'à 100° en ouvrant tous les ventilateurs, et même, s'il y a besoin, on entr'ouvrira la porte de la couveuse. Il serait bon d'ouvrir complètement cette porte deux ou trois fois pendant quelques instants, pour habituer les poussins au changement de température et d'air. Si l'on agit ainsi, ils souffriront moins, lorsqu'on les transportera dans leur éleveuse.

RETOURNEMENT DES ŒUFS.—Après 24 heures d'incubation on retourne les œufs une première fois, et