

ra être semée au mois de mai. Je n'ai jamais vu de la rouille en août. Avec toute autre qualité, il y a beaucoup de dangers, lorsque le blé est semé tard. Cette année on devrait chercher soigneusement à se procurer diverses qualités et variétés de graines de semences, qui résisteront tant à la rouille qu'à la mouche, en prenant des précautions on peut obtenir encore un blé meilleur, et en plus grande abondance que jamais. Il faut que la graine fomentée dans une forte fumure, et en ôter tous les grains légers, et le reste de la graine pour semer mêlée avec de la chaux bouillante avant de semer. Ceci prévient les ordures dans le grain, si c'est bien exécuté.

Il faut à présent porter son attention à la laiterie, le beurre fait avec soin, si on le destine pour le marché ou à l'exporter. Il faut le mettre dans des barrils blanches, capables d'en contenir 56 livres chacun. Le beurre doit être de la même couleur et salé uniformément, et quand le barril est plein, il faut le fonder et en exclure l'air. Une laiterie qui pourrait être tenue dans une température propice est très-essentielle à l'art de faire le bon beurre, et l'excellent fromage.

**Juin.**—Tout cultivateur laborieux et industrieux aura ses semences et ses plantations finies avant le premier de ce mois, excepté le sarrasin et les navets; le sarrasin peut se semer jusqu'à la fin de ce mois, et les navets du 15 au 15 juillet. La cendre est la meilleure préparation pour le navet, et soit sur la terre moussue ou la terre unie, il poussera mieux. Le grand secret est d'empêcher la jeune plante d'être atteinte par la mouche, et on y parviendra plus aisément en facilitant sa sortie de terre à force d'engrais. La plante a généralement passé le danger dans une semaine après qu'elle est parue hors de terre. Faites attention aux patates durant ce mois. Piochez et labourez autant qu'il est nécessaire. Ne négligez pas de sarcler les terres semées de grains. Les labourages d'été devront recevoir un labourage de travers et toutes les mauvaises herbes devront être ramassées dans un tas pour l'engrais, ou brûler sur le sol, et avec une partie du terrain s'il est sec. C'est vers le 25 de juin que la mouche fait son apparition.