

TRAVAUX ORIGINAUX

PROPHYLAXIE DE LA PARALYSIE INFANTILE ET LES REGLEMENTS DU CONSEIL SUPERIEUR D'HYGIENE DE LA PROVINCE DE QUEBEC SUR LES MALADIES CONTAGIEUSES

Professeur à l'Université Laval

Dr R. FORTIER

Depuis quelques mois il existe dans certaines villes (Québec, Lévis) et certaines paroisses du District de Québec des cas isolés de poliomyélite antérieure aiguë. Ces cas paraissent légers sous le rapport des symptômes généraux et de la paralysie consécutive. Un seul enfant est atteint dans la famille quelle que nombreuse qu'elle soit et bien que les frères et sœurs soient en contact intime avec le malade. Les enfants atteints présentent pendant 2 ou 3 jours quelquefois plus un peu de fièvre avec des douleurs de tête, des douleurs dans les membres et même au niveau du tronc, un

1. Travail lu à la Soc. Méd de Québec, sept. 1919.

**INFECTIONS ET TOUTES
SEPTICEMIES**

Traitement LANTOL
— PAR LE

(Académie des Sciences et Société
des Hôpitaux du 22 décembre
1911.)

Rhodium B. Colloidal

électrique

LABORATOIRE COUTURIERX
18. Avenue Hoche - Paris

Ampoules de 3 c'm