

- Ailes postérieures sans bande jaune sub-apicale **6. stygipes.**
 Pattes jaunes ;
 Ailes blanches avec taches noires..... **2. dossuaria.**
 Ailes jaunes avec taches noires ou brunes ;
 Ailes inférieures avec une tache discoïdale à
 peine distincte, leurs bords ponctués de
 brun à l'extrémité..... **3. semifasciata.**
 Ailes inférieures avec une bande brune sub-
 apicale bien distincte ;
 Bande brune des ailes postérieures étroite,
 anguleuse..... **4. ocellifera.**
 Bande brune des ailes postérieures large,
 avec tache pâle en dedans..... **5. postica.**

1. Neuronie panthère. *Neuronia pardalis*, Walk.—Long.
 .118 pce ; extension des ailes 2 pces. Noire, couverte de poils jaunes
 en dessous. Les cuisses antérieures jaunes. Ailes supérieures à points
 nombreux, jaunes, ces points confluent dans les ♂ ; les postérieures
 ponctuées de jaune antérieurement, avec une grande bande jaune sub-
 apicale.—R.

Rare dans le voisinage de Québec.

2. Neuronie à dos taché. *Neuronia dossuaria*, Say.—Long.
 .55 pce ; extension des ailes .88 pce. Corps jaune-ochre pâle ; ailes
 blanchâtres ; antennes noires ; yeux noirs. Ailes d'un jaune blan-
 châtre, avec nombreuses taches noires en carrés ou en lignes, une plus
 grande se montre à l'endroit du stigma et une autre à l'angle anal,
 cette dernière produisant une petite bande transversale lorsque dans le
 repos les ailes se trouvent rapprochées. Ailes postérieures avec 2 larges
 taches au bord costal et l'extrémité obscures. Les pattes et l'abdomen
 jaunes comme le corps ; l'extrémité des jambes postérieures avec un
 petit anneau, noir ; leurs épines aussi noires.—PC.

3. Neuronie semifasciée. *Neuronia semifasciata*, Say.—Long.
 .1 pce ; extension des ailes 1 20 pce. Jaune-fauve. Antennes annelées
 de brun à la base, fauves à l'extrémité ; la tête obscure sur le vertex,
 de même que les côtés du prothorax. Tête et prothorax ciliés de poils
 bruns. Ailes supérieures avec nombreuses taches brunes produisant
 des petites stries en certains endroits, les bords à l'extrémité avec taches
 alternes brunes et jaunes ; ailes postérieures avec le bord apical à peine
 tacheté de brun, quelquefois une bande sub-apicale plus ou moins obli-
 quée d'un brun pâle. Pattes de la couleur du corps ; abdomen plus ou
 moins obscur à l'extrémité.—C.