

d'eau et suivie d'une friction au gant de flanelle humecté d'alcoolat de lavande.

3° Si les sueurs sont localisées ou tout au moins prédominantes dans certaines régions, thorax, dos, aisselles, etc., poudrer largement ces régions avec :

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tannoforme..... | } àà 30 gr. |
| Poudre de talc..... | |
| Poudre de lycopode..... | |

Si les sueurs sont modérées et ne troublent pas trop le sommeil, s'en tenir à ces mesures hygiéniques; dans le cas contraire, traitement plus actif, mais variable suivant qu'il y a ou non coexistence de fièvre.

4° Au cas où les sueurs se produisent comme stade terminal de l'accès fébrile, il faut tendre à diminuer l'intensité de celui-ci et, secondairement, celle des sueurs, en prescrivant :

| | |
|-----------------|----------|
| Cryogénine..... | 0 gr. 10 |
|-----------------|----------|

pour un cachet. Deux cachets par jour, le premier deux heures avant le début présumé de l'accès fébrile, le second avant le dîner;

Ou bien :

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Camphorate acide de pyramidon..... | 3 gr. |
| Sirop de limon..... | 30 gr. |
| Eau distillée..... | q. s. p. 150 cc. |

une cuillerée à soupe vers 6 heures, une seconde à 10 heures du soir.

5° Si les sueurs paraissent indépendantes de tout état fébrile prescrire :

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Poudre d'agaric blanc..... | 0 gr. 30 centigr. |
| Phosphate de chaux..... | 0 gr. 50 centigr. |
| Poudre d'opium.....; | 0 gr. 02 centigr. |

pour un cachet; en prendre deux par jour, avant le dîner et le soir à 10 heures (médication à éviter chez les tuberculeux atteints de troubles intestinaux, notamment de tendance à la diarrhée);

Ou bien :

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Teinture d'hydratis canadensis..... | } àà 10 gr. |
| Teinture de sauge..... | |
| Teinture de belladone..... | |