

de douleur ; la malade marche sans support. Cinquante-deuxième application : guérison complète.

20. Jeune homme de 17 ans : fièvre scarlatine grave suivie de pneumonie ; vive douleur en urinant, en même temps gonflement douloureux et élastique le long de l'urèthre et au périnée. Dix jours ensuite douleur et tension au dedans de la cuisse droite, grande sensibilité du scrotum et engorgement inflammatoire des glandes inguinales superficielles et profondes. La douleur et le gonflement de l'urèthre et du périnée disparaissent, mais l'engorgement inguinal augmente ; amaigrissement, perte des forces, pouls à 140. Traitement : applications froides, fer, iodure de potassium, glycérine. Ces moyens ont peu d'effet sur la tumeur.

Au moment où l'on a recours à l'électricité, la tumeur est dure, douloureuse, non mobile, elle occupe la face interne de la cuisse droite jusqu'à la partie moyenne de la face antérieure ; la peau est saine, la température est un peu élevée ; le membre a 9 centimètres de circonférence de plus que celui du côté opposé ; les mouvements actifs sont impossibles et les mouvements communiqués entraînent le bassin avec la cuisse.

Le pôle positif est appliqué sur la colonne vertébrale et le négatif avec l'électrode en brosse métallique est appliqué sur la tumeur. Dixième application : la circonférence de la cuisse a diminué de 3 centimètres, la longueur de la tumeur a diminué elle-même de 5 centimètres. Le malade se sent mieux, ses mouvements sont moins difficiles. Vingtième application : diminution très grande de la tumeur, le malade peut faire quelques pas avec des béquilles. Vingt neuvième application : la tumeur n'est plus visible, le malade marche sans soutien, il se sent très-bien. Le traitement par l'électricité a duré sept semaines. (*The Medical World*, octobre 1871.)

---

TRAITEMENT DU HUXON.—Dans une lecture publiée dans le *Wiener. Med. Wochenschrift*, mars, 9, le Professeur Zeissl, de Vienne, énumère les grands avantages qu'il a obtenus de ce