

clientèle dans la ville. Il leur dit qu'il n'avait jamais rencontré un pareil cas, que c'était un travail ordinaire, et qu'il se terminerait d'une façon ordinaire. Elle eut trois jours de douleurs sévères sans aucun bébé, et alors tout se calma et il fut dit que c'était une tumeur fantôme qu'elle avait eue.

Un autre exemple d'il y a une dizaine d'années. Une femme, dans la partie est de Montréal, fut prise de crampes sévères et de syncope après avoir mangé de bon cœur quelque nourriture indigeste. Le médecin du voisinage fut appelé et il déclara que c'était un cas d'indigestion pour lequel il prescrivit un émétique qui eut son effet, mais, au lieu de s'améliorer, sa condition s'aggrava tant que le médecin fut renvoyé et on en appela un autre. Il conclut que le cas était grave, mais pensa qu'il y avait quelque attaque de nerfs aiguë, car la femme était très agitée et criait qu'elle allait mourir. On appela un troisième confrère plus âgé qui s'informa de grossesse, mais comme elle n'avait pas manqué une période, et qu'au contraire elle avait eu menstruation deux fois dans le dernier mois, et avait même perdu un peu, il différa sa proposition, et fit le diagnostic d'ulcération de l'estomac. Pendant ce temps, la femme se mourait et recevait les derniers sacrements. On consulta un quatrième médecin qui eut l'idée de grossesse tubaire, M. le docteur Warren, un de mes élèves, qui m'avait assisté dans une demi-douzaine de laparotomies pour hémorragies abdominales ; reconnaissant l'état, il proposa une intervention et triompha des nombreuses difficultés et obstacles qui sont toujours placés à dessein sur le chemin de l'homme qui propose de faire quelque chose hors de l'ordinaire. Enfin, la femme fut opérée ; elle était sans pouls, presque sans connaissance, son abdomen dilaté fut ouvert et nettoyé. Le sang jaillit avec violence, et chacun des tubes et ovaires fut pris et examiné sans pouvoir trouver la source de l'hémorragie. Alors, l'utérus fut remonté, et là, dans le coin gauche, juste à l'endroit où le tube passe à travers la paroi utérine, là se trouvait une déchirure en lambeaux d'où s'échappait du sang d'un rouge encore très brillant. A l'in-