

## APPENDIX.

- curcu- A. CERAMBYX thorace mutico: ocellis quatuor ni-  
lioides. gris elytrisque sesquialtero, antennis mediocribus.  
(pag 395. §. 44-45).  
*Habitat in Germania. Berg Isacson.*  
*Statura & Magnitudo Curculionis abietis. Thorax*  
*Elytraque nebulosa: strigis flavis, sparsis, undatis.*  
*Ocelli 4 supra thoracem, quorum posteriores mino-*  
*res, prioribus approximati; Elytra singula in medio*  
*Ocello atro iride lutea & antierius ocello dimidiato*  
*minus evidenti.*
- Catax. A. PHALÆNA Bombyx *clinguis*, alis reversis flavis uni-  
coloribus: puncto flavo. (p. 500. §. 20-21).  
*Habitat in Germania. Berg Isacson.*  
*Statura & Magnitudo PH. B. Neustriae, sed tota fla-*  
*va: alarum puncto centrali albo: margine obsolete ru-*  
*fo. Inferior Alarum margo reversus albus.*
- grammi- B. PHALÆNA Bombyx *spirilinguis*, alis deflexis luteis:  
ca. superioribus flavis nigro striatis; inferioribus fascia  
terminali nigra. (p. 506. §. 51-52).  
*Habitat in Germania. Idem.*  
*Statura PH. Jacobæe, sed paulo major. Ala Superiores*  
*angustæ & fere lanceolatae, inferioribus pallidiores:*  
*Striis nigris subramosis; subtus versus apicem fusce-*  
*scentes. Inferiores saturate-luteæ: postice supra fa-*  
*scia latiuscula nigra & subtus fascia puncto majuscu-*  
*lo nigra. Abdomen luteum, quinquesariam nigro*  
*punctatum. Antennæ nigrae, angustissima, ut vix*  
*manifeste pectinatae.*
- rufina. C. PHALÆNA Bombyx *spirilinguis cristata*, alis rufis:  
fasciis subfuscescentibus: postica latiore; subtus rufe-  
scentibus. (p. 507. §. 57-58).  
*Habitat in Germania, ab eodem.*  
*Antennæ angustissima. Tentacula magis saturate rubra.*
- Hecta. D. PHALÆNA *Noctua clinguis lutea*, alis deflexis:  
superioribus fasciis duabus albidis obliquis punctato in-  
terruptis. (p. 508. §. 61-63).  
*De Geer inf. t. 7. f. 12.*  
*Habitat in Europa. Clerck.*

Simil-

Ea qua

q

Si

cutona- E. P  
ria. 1Ha  
Orurinana. F. P  
1Ha  
Aladdman- G. P  
niata. 1Ha  
Al

Planci. A. A

n  
Col  
c  
Ha