

TRAVAUX ORIGINAUX

CLINIQUE OTOLOGIQUE.

HOPITAL NOTRE DAME, (Montréal).—M. FOUCHER.

De l'inflammation folliculaire du conduit auditif externe.

MESSIEURS.

Vous voyez souvent des malades qui se présentent à la clinique avec pâleur de la face, et contraction des traits de la figure; ils marchent avec précaution, en portant la main à leur oreille; ils articulent à peine leurs mots en parlant. Si vous les interrogez, vous apprenez que ces patients ont beaucoup souffert depuis quelques jours, que la mastication est devenue presque impossible à cause des douleurs qu'elle provoque, et qu'enfin à tous ces symptômes sont venus se joindre des bourdonnements d'oreilles et un degré plus ou moins prononcé de surdité. À en juger par l'intensité des douleurs et le cortège des autres symptômes, on se croirait, la plupart du temps, en face d'une maladie grave compromettant sérieusement les fonctions auditives. Bien souvent, heureusement, il n'en est rien. Ces symptômes qui, au premier abord, en imposent pour une otite moyenne purulente ou une ostéo-périostite de l'apophyse mastoïde, appartiennent à une maladie vulgaire: la *furunculose du conduit auditif externe*, autrement connue et décrite sous le nom d'*otite externe circonscrite* et mieux sous celui d'*inflammation folliculaire du conduit auditif externe*.

Le siège de prédilection de cette inflammation est la portion cartilagineuse du conduit auditif, là où il y a des glandes et des follicules. Tantôt cette inflammation est superficielle, tantôt elle siège profondément près du périchondre. L'étendue de l'inflammation, la profondeur à laquelle elle siège, la portion du conduit auditif où elle se développe, contribuent à donner à la maladie des caractères variables. Il ne faut pas s'attendre à toujours reconnaître l'otite externe circonscrite aux symptômes que j'ai mentionnés précédemment. Les malades n'en souffrent pas toujours à ce point, on remarque même des cas où un furoncle volumineux ne donnera lieu à aucune douleur sérieuse, tandis qu'un petit furoncle provoquera de vives douleurs.

C'est à l'endroit où se développe la lésion qu'il faut chercher la