

il en est au contraire le préservatif le plus puissant. Voilà comment s'exprime le chef de l'école de Lyon qu'on ne peut pourtant pas accuser d'un amour excessif pour la médication hydrargyrique. Combien de temps doit durer le traitement ? La réponse ne souffre pas d'hésitation. Le traitement de la syphilis chez la femme enceinte doit durer au moins autant que la grossesse en tant que maladie pouvant provoquer l'avortement. Après l'accouchement la femme rentre dans les conditions ordinaires de la vie et la suivre sortirait des limites de ce travail uniquement consacré à la grossesse. Du reste, il est à ce sujet des règles tracées de main de maître par monsieur le professeur Fournier : "on ne guérit la vérole, dit-il, ou pour mieux dire on n'impose silence aux manifestations de la vérole qu'au prix d'un traitement long, très long, exigeant au minimum plusieurs années, Ce traitement, dit-il, pour être efficace a besoin d'une direction particulière, il doit être tour à tour interrompu, repris, cessé, repris sous des formes diverses. En un mot la vérole est une maladie chronique dont on ne se débarrasse que par un traitement chronique, voilà le fait." Il est d'ailleurs de la plus grande importance pour la terminaison heureuse des accouchements à venir de continuer longtemps le traitement. En outre, comme l'a si éloquemment exprimé Verneuil. "tenir absolument à savoir quel degré d'intensité possède le poison, quels ravages il est capable de faire et attendre avec patience que le virus s'installe dans l'économie c'est être plus curieux qu'actif, plus naturaliste que médecin. S'il est un cas où la médecine expectante ne soit pas de mise, c'est bien dans la syphilis où il y a lutte de vitesse entre le spécifique et la maladie et où la victoire n'est que plus facile pour le traitement s'il a de l'avance sur l'affection qu'il combat.

MODE DE TRAITEMENT

Le traitement de la syphilis pendant la grossesse pourrait être exactement ce qu'il est en dehors de l'état de gestation, si la susceptibilité des voies digestives ne commandait une certaine prudence. Il est certain qu'on devra combattre les accidents au fur et à mesure de leur apparition mais le traitement mercuriel, le seul vraiment efficace, pouvant chez certains organismes maternels produire vomissements ou diarrhée, devra être manié avec précaution pour éviter que par suite de l'irritation de l'estomac ou des intestins il ne se produise un avortement. Tous les modes de traitement mercuriel, pas plus que toutes les préparations mercurielles, ne sauraient donc convenir aux femmes enceintes.

Le mercure seul, ou quand il le faut, combiné avec l'iodure de potassium peut être administré par les voies digestives, estomac, rectum, par les voies respiratoires, par la peau, par la méthode sous-cutanée. Il ne sera question ici que des modes de traitement