étendu dans toutes ses parties, les les points a a sont plus abaisses et plus tant vers l'anus est plus rétrécie, avec un poil hérissé, surtout du côté droit ; il ne remonte plus jusqu'à l'anus que da côté gauche. En dedans de la cuisse, dans la partie moyenne del'écusson, du côté droit, on remarque un ovale e formé de poil descendant, ce quidenote un produit inférieure, surtout quand cet épi est grand et recouvert d'un poil long et fourré.

En générale dans toutes les classes et dans tous les ordres de classification. lorsqu e cet épi se présente non seulement sur le plat intérieur de la cuisse droite, mais quelque fois sur toutes doux, on doit les descendre d'un ou plu sieurs ordres suivant l'étendue de cet épi.



3er ordre.—Mauvais.

L'écusson est tout-à-fait resserré ; il est circon crit à la partie inferieure des cuisses, et ne remonte que très per au dessus du Scrotum, (bourse) quelques poils longs et hérissés font seuls, distinguer sa présence.

Nous reproduisons de la "Gezette de Joliette " les excellentes remarques qui suivent:

Nous avons souvent parlé de cet art si noble et si utile, et pour a usi le plus nécessaire dans notre pays., Nous avons souvent encourage le cultivateur à donner une attention sérieuso à la science agricole; en d'autres termes, nous avons combattu la routiue et nous avons dit où et comment les habitants des campagnes peuvent ap preudre à sortir de l'ornière où ils sont ancrés depuis longtemps : dans les écoles d'agricultures que les jeunes gens qui se destinent à l'état de cultivateur, dovraient fréquenter on grand nombre.

Il y a peu d'années encore, l'on pouvait s'excuser sur la rareté et l'éloignement de ces maisons d'education. Elles étaient en petit nombre, et la plus proche était bien loin de ces campagnes. Aujourd'hui, la même raison n'exis-te pas. Nous avons une école d'agricul-

digne prêtre, le Rev. M. Dozois, a des ides citrouilles, des pommes et d'autres professeurs spéciaux qui so distinguent végétaux, mêles avec du son. resserrés; la partie de l'écusson remon- dans l'enseignement, de l'agriculture, donnent cette nourriture que lorsqu'el-Une ferme modèle est à la disposition le a commence à fermenter un pen. As des clèves, en sorte qu'ils peuvent ap- finissont par donner des repas de grain, pliquer la pratique aux theories qui tel que du sarrezio, de l'avoine fmouleur sont enseignees.

> et estimée au loin Nous regrettons de le nourriture n'est pas donnée crue. dire qu'elle semble ignorée par les habitants de ce district qui y envoient chons, et de leur donner une boite de trop peu leurs enfants. Beaucoup de personne croient que c'est de l'argent perdu que celui dépensé pour apprendre à cultiver la terre et tirer de son sein les plus beaux fruits. L'on se faire cuire la nourriture. trompe étrangement.

Dans un pays comme le nôtre, on ne saurait trop accorder de soin à l'étude d'un art, qui est de notre première ressource, et qui subvient à nos plus grands besoins.

Si done, comme nous l'avons déjà dit, notre voix pouvait être entendue par tout le Leau district de Jaliette, nous conseillerions à ses habitants de faire fréquenter l'ecole d'agriculture de l'Assomption par leurs enfants, afin qu'ils y apprissent la meilleure manière de cultiver, le meilleur emploi du temps pour le propriétaire, le mode de se servir des engrais, et le les augmenter, le goût de l'élevage des beaux animaux, et le soin que ces derniers demandent pour être plus avantageux. "

DE L'ENGRAIS DES COCHONS.

Le meilleur temps pour l'engrais des cochons est les mois de septemore,octo bre et novembre. Décembre, janvier et février ne sont pas aussi ayanta geux que les mois précédents, parce qu'ils sont trop rigoureux.

Dans les mois froids, l'animal prend une certaine quantité de nourriture qui ne lui sert qu'à obtenir la chaleur dont il a besoin; tandis que durant les mois plus doux, cette nourriture lui sert à acquérir de l'embompoint et de

cent de la nourriture qu'on donne aux cochons, par la geléc, par le trouble qu'on est obligé de se donner pour faire dissoudre ce qui se prend en glace dans le fond des auges.

L'écusson est moins développé, moins | tion. Cette institution dirigée par un par leur donner des patates bouillies, lue, ou du blé-d'inde ou des pois. Le Cette école d'agriculture est connue cochon profite toujours plus quand cet-

> Un bon moyen d'engraisser les co moulce d'orge et ble-d'inde mêlé ensemble dans les oaux de vaisselles et d'autres eaux sales de la maison.

> Dans tous les eas, il est mieux de

Il est bon anssi de brosser et de laver les co-hons et de les tenir blea proprement dans lears appartements. Cela donne du trouble, mais on en est bien payé.

Il ne faut pas (rop laisser vieitlir la nourriture.

I a pratique qu'ont certaines personnes de laisser continuellement de la nourriture dans les auges est mauvaise. On gaspille ainsi boaucoup. Il en est de même des repas servis irrégulièrement. Il fant toujours soigner les cochons régutièrement, à la même heure de la journée; cette régularité doit être observée dans la quantite et la qualité de la nourriture.

DES POMMES POUR LES VACHES

Quolques personnes empêchent leurs v ches de manger des pommes, parce que quelquefois, cela occasionne lenr tarissement. Îl n'y a pas de doute qu'une vache qui se gorgerait immodérement de pommes en souffrirait, et cela arrive également quand un animal mange à l'excès n'importe quelle espèce de grain, ou quand il boit sans mesure. Mais quand on soigne les animaux raisonnablement ils ne font que profiter de la nourriture qu'on leur donne. Il en est de même des pommes. En donnant régulièrement à une vacho einq ou six pintes de En outre de cela, on perd encore pommes douces soir et matin, durant dans les mois froids, au moins 5 pour l'automne et l'hiver, ce traitement scrait favorable à sa santé et contribuerait à lui faire donner une plus grande quantité de lait, qui serait aussi d'une qualité supérioure.

Les pommes qui ne conviennent Il y a fferentes méthodes d'engrais aux vaches ne sont pas ces pommes déture à notre porte, -au village de l'As- ser les cochons. Les uns commencent licates dont on se sert pour la table,