

Le grattage de l'écorce peut se faire en tout temps; mais il vaut mieux profiter du moment où les écorces sont attendries par quelques jours d'humidité. Elles s'enlèvent très facilement, surtout si on se sert d'un instrument convenable.

Je me résume :

Tout propriétaire, soucieux de ses intérêts, devra entretenir le tronc et les branches de ses arbres fruitiers et autres dans un état de propreté parfaite.


L'ABBÉ LAFÈVRE.

(Ann. soc. hort. et for. de l'Aube)

" 1. Distribuez la nourriture régulièrement, c'est-à-dire quatre fois par jour, à intervalles aussi exacts que possible

" 2. Variez la nourriture, ajoutez-y aussi un peu de farine d'os, d'écailles d'huîtres moulues, etc., et donnez le soir une ration plus abondante pour que le gésier puisse fonctionner toute la nuit.

" 3. Ayez soin de donner aux animaux l'exercice nécessaire. On y parvient dans un parquet resserré en jetant les grains entre de la balle de blé ou de la paille hachée pour qu'ils soient obligés de les chercher en grat-



ÉTALON SHIRE ANGLAIS "GARFIT" 3093.

#### Les règles d'or des éleveurs de volailles.

Sous ce titre nous trouvons, dans *l'oiseau et sa volaille* les lignes suivantes que nous reproduisons ici comme une sorte de memento des conseils que nous avons maintes fois donnés à nos lecteurs :

" M. Ehlers, rédacteur du *Praktische Geflügel Züchter*, écrit les lignes suivantes que nous nous empressons de traduire :

" Si vous voulez obtenir de bons résultats dans l'élevage des volailles, donnez-y les soins les plus minutieux. A la suite de longues années d'expérience je recommande l'application des règles ci-dessous :

tant le sol.

" 4. Donnez un bain de poussière, auquel il est bon de mélanger un peu de cendres de charbon.

" 5. N'oubliez pas de changer l'eau deux fois par jour, de nettoyer chaque fois les augots, et d'ajouter à l'eau un peu de fer rouillé par de l'acide de pommes.

" 6. Faites de temps en temps la chasse aux insectes, débarrassez-en les oiseaux par de la poudre insecticide et blanchissez souvent les poulaillers. Il est bon d'ajouter du chlorure de chaux ou de l'acide phénique.

" 7. La verdure doit être donnée depuis le commencement, la viande depuis l'âge de quatre semaines.