

et la nuque, soit par la région pariétale, ne peuvent franchir ensemble le détroit supérieur.

*On doit tenter successivement : 1° de repousser la tête du second fœtus ; 2° la craniotomie sur la tête du second fœtus, s'il est mort ; 3° comme il est facile de le concevoir, c'est généralement sur le premier fœtus qu'on pratique l'embryotomie ou toute opération de réduction, parce que ce premier enfant meurt rapidement, vu la position qu'il occupe, et qu'alors l'enfant étant mort il est permis de lui faire toute opération mutilatrice qui permettra d'extraire le second enfant.*

*V. Fœtus en T. — Le premier enfant se présente par la tête, le deuxième par le tronc, ou le premier fœtus se présente par le siège, le deuxième par le tronc.*

L'accouchement du premier fœtus ne présente guère de difficulté. Le second fœtus se présente par le thorax ou l'abdomen. Il faut faire la version par manœuvres internes pour ce second fœtus. Morgagni et Solayrès de Renhac citent chacun un cas où l'épaule du premier enfant était retenue par le cou du second. Baudelocque et Dunal citent également chacun un cas où le menton du premier enfant était retenu par le cou du second.

*VI. Fœtus en renversé. — Le premier enfant se présente par le tronc, le second par le siège, ou le sommet.*

D'après Auvard trois cas peuvent se présenter :

1° Ou le premier fœtus se présente transversalement et obstrue complètement l'accès du détroit supérieur. Extraire le premier enfant par la version. Si le second fœtus était facilement accessible, on pourrait essayer de l'extraire le premier.

Ou le second enfant, s'étant insinué entre le premier et l'utérus, arrive ainsi à se présenter le premier, soit par le sommet (2e cas), soit par le siège (3e cas).

2° Par le sommet. — L'épaule de l'enfant qui se présente par le sommet peut être arrêtée par le cou du fœtus transversalement placé.

3° Par le siège. — Accrochement possible de la tête de l'enfant engagé, au cou du fœtus resté dans l'utérus.

*VII. Fœtus antéro-postérieurs. — On peut rencontrer ici les mêmes difficultés que lorsque les fœtus se présentent en 99, c'est-à-dire l'un à côté de l'autre.*