

LE

# Naturaliste Canadien

Vol. IV.

Québec, JUILLET, 1872.

No. 7.

Rédacteur : M. l'Abbé PROVANCHER.

## FAUNE CANADIENNE.

### LES OISEAUX.

(Continuée de la page 164).

#### IV Fam. des ICTERIDES. *Icteridæ*.

Primaires 9. Bec long, égal ou plus long que la tête, droit ou légèrement courbé, conique, sans échancrure, commissure obtusément anguleuse à la base. Tarses scutellés en avant avec de grandes plaques en arrière. Jambes fortes. Phalange basilaire du doigt médian libre du côté intérieur à demi libre du côté extérieur.

Cette famille qui appartient exclusivement au nouveau continent, se partage en trois sous-familles qu'on peut distinguer par les caractères suivants.

Bec à pointe non rabattue en bas ;

Bec fort, pointu, pas plus long que la tête, presque droit.

Pieds propres à la marche..... *Agélaines*.

Bec grêle, allongé, très aigu, aussi long que la tête, légèrement courbé. Pieds disposés pour percher..... *Ictérines*.

Bec aussi long ou plus long que la tête, à sommet courbé et à pointe très rabattue en bas ; chaque mandibule paraissant comme arrondie..... *Quiscalines*.

#### Sous-famille des AGÉLAINES. *Agelainæ*.

Bec fort, conique, aigu, pas plus long que la tête, presque droit jusqu'à la pointe. Jambes plus longues que la tête, propres à la marche ; ongles forts, peu recourbés. Queue moyenne, plus courte que les ailes, presque égale.