brosse à dents que quand il commence à se préoccuper de la forme de son faux-col ou de son nœud de cravate. Aussi la fréquence de la carie dentaire est-elle grande chez les écoliers : sur 169 écoliers de 8 à 17 ans, Sher a trouvé 189 (!) dents cariées : les deuxième et troisième molaires inférieures étaient le plus fréquemment atteintes.

A côté des dentifrices *liquides* dont je parlais tout à l'heure, se placent toute une série de dentifrices pulvérulents, qui font le bonheur des parfumeurs. Beaucoup de ces préparations mal pulvérisées, contenant des aiguilles blessantes, sont détestables.

Voici deux formules que je recommande aux mères de famille. Elles peuvent les faire exécuter par leur pharmacien :

Acide borique finement pulvérisé...	25	grammes
Clorate de potasse..	20	—
Poudre de gaïac....	15	—
Craie préparée.....	40	—
Carbonate de magnésic pulvérisé...	40	—
Essence de rose ou de menthe.....	X	gouttes.

ou encore :

Charbon végétal porphyrisé et lavé.....	12	grammes
Craie préparée .	12	—
Quinquina rouge pulvérisé.....	12	—
Magnésie calcinée.	8	—
Essence de menthe	V	gouttes.
Mélez.		

* * *

Si on exécutait à la lettre tous les soins précédents, il n'y aurait plus de *carie dentaire*. Que les dentistes se rassurent. Pour leur bonheur, elle existera longtemps encore. Quand

cette carie frappe les dents de lait, il faut se hâter de les soigner. C'est encore un préjugé de croire qu'on ne doit pas panser les dents de lait. Tout comme les dents définitives elles doivent être remises dans le même état, puisqu'elles ont à remplir le même usage. J'ajouterai même qu'elles doivent d'autant plus être soignées qu'il faut éviter de les faire *extraire* à cause des déformations qui peuvent en résulter pour la mâchoire et se traduisent par des dépressions très laides dans la figure.

Les ciments dentaires sont aujourd'hui très variés : l'or en feuilles, le platine, l'argent, le cadnum, le gutta-percha, etc.

Quand il n'y a pas moyen de faire autrement et que la dent, ne pouvant être obturée, est la source de douleurs intolérables, il faut se résigner à la laisser extraire. Je n'ai pas à entrer ici dans la partie *mécanique* du sujet. La clef de Garangeot est morte, vivent les daviers. Un point au sujet duquel je voudrais attirer l'attention, c'est sur les injections de *cocaïne* faites pour insensibiliser la gencive. Ces injections ont été, sont et seront encore le point de départ d'accidents *graves* chez les enfants; aussi ne doivent-elles être faites que dans des cas tout à fait exceptionnels et toujours sous le contrôle du médecin. Pas n'est besoin, du reste, de ces injections chez les enfants.

Pour obtenir l'insensibilité de la gencive, il suffit de faire dissoudre 2 grammes de cocaïne dans un peu de chloroforme. On en forme une pâte qu'on applique tout autour de la gencive. Huit à dix minutes suffisent pour obtenir l'insensibilité.

Qu'on se le dise !

DR CARADEE.