

Le traitement doit s'inspirer de la cause. Il faut réduire l'alimentation et le nombre de repas, et instituer un régime spécial.

Il ne faut pas abuser des médicaments. Il faudra cependant combattre les trois symptômes suivants: atonie, constipation, anorexie; il y a donc lieu de donner ici les alcalins, la strychine, de la magnésie, du fer.

Le praticien pourra choisir parmi les formules qui sont conseillées par l'auteur.

R

1 ^o Bi-carbonate de soude.....	0 gr. 25 centig.
Magnésie calcinée.....	0 gr. 20 centig.
Poudre de canelle.....	0 gr. 15 centig.
Protoxalate de fer.....	}
Poudre de noix vomique	} à 1 centig.

Pour un paquet no 20. Deux par jour durant dix jours dans une cuillerée à café de lait ou d'eau sucrée pour un enfant de deux ans.

Ou bien:

R

2 ^o Bi-carbonate de soude.....	0 gr. 20 centig.
Salycilate neutre de bismuth	}
Benzo-naphtol	} à 0 gr. 15 centig.
Protoxalate de fer	} 1 centigramme.

Pour un paquet no. 15. En prendre trois par jour: pour un enfant de 15 mois ayant de l'anémie dyspeptique avec diarrhée et selles fétides.

Ou bien:

R

3 ^o Bicarb. de soude	0 gr. 20 centig.
Craie préparée	0 gr. 15 centig.
Pepsine	0 gr. 10 centig.
Poudre de sciences d'anis	0 gr. 05 centig.
Poudre de noix vomique	3 milligrammes.

Pour un paquet no. 14. Deux par jour pour un enfant de 15 à 18 mois ayant du tympانisme, des renvois gazeux.

Toutes ces poudres devront être suspendues après huit à dix jours pour un repos égal.

Il sera urgent de faire l'antisepsie intestinale par le calomel, soit en une dose unique de 0 g. 30 centigr. soit par doses fractionnées de un à deux centigrammes quatre à cinq fois par jour. Les lavages de l'intestin sont excellents.

Dans certains cas graves on pourra songer à l'emploi du fer en injections sous-cutanées. L'auteur préconise la formule de M. Mousnier:

R

Chlorure double de fer et de quinine	10 centig.
Véhicule stérilisé	10 c. c.

Une seringue de Pravaz par jour. Ces injections sont réservées pour les cas graves.

On surveillera les intestins: des petits suppositoires ou lavements à la glycérino seront utiles dans certains cas. Il faudra surveiller également les gencives (scorbut) et donner du jus d'orange ou de raisins. En un mot les prescriptions hygiéniques connues du plus grand nombre des praticiens.

J. A. LESAGE.