

rachicocainisation. (V. articles spéc.). — *Pos.* : Chez l'enfant : jusqu'à 0 gr. 02 ; chez l'adulte, jusqu'à 0 gr. 15. La solut. injectée ne doit pas dépasser le titre de 1 %. — *Toxique.* — *Assoc.* : Avec la morphine pour anesthésie très étendue (soluté de Schleich) ; avec l'adrénaline pour anesth. locale.

Codéine. — *F. us.* : Chlorhydrate. — *S. Eau.* — *P. T.* : Hypnotique, analgésique. — *Ind.* : Emphysème, asthme, dyspnée cardiaque. — *Pos.* : 0 gr. 02 à 0 gr. 08 par 24 h. — *Inj. sous-cut.*

Colchicine. — *S. Eau.* — *R. T.* : Diurétique, antigoutteux, antirhumatismal. — *Pos.* : chez adulte. 2 à 5 milligr. par 24 h. — *Inj. sous-cut.*

Collargol. — *V. Argent colloïdal chimique.*

Colamine. — Produit d'oxydation de la narcotine. — *Syn.* : *Slyptine* (déposé). — *F. us.* : Chlorhydrate. — *P. T.* : Hémostatique. — *Ind.* : Metrorrhagies profuses. — *Pos.* : 0 gr. 10 à 0 gr. 20 par 24 h. — *Inj. intramus.* — *Douloureux.* — Provoque contractions utérines.

Créosote. — *S. huile.* — *P. T.* : Antiseptique, antispasmodique, stimulant. — *Ind.* : Tuberculose. — *Pos.* : Chez l'enfant, jusqu'à 5 gr. chez l'adulte, jusqu'à 15 gr., en solut. huileuse étendue.

Cyanure de mercure. — (V. *Mercure*).

D

Digitaline (Syn. *Digitoxine*). — *S.* chloroforme et huile ; insol. eau. — *P. T.* : Tonique du cœur, diurétique. — *Ind.* : Cardiopathies valvulaires, affections cardiaques non compensées. *Pos.* : $\frac{1}{2}$ milligr. par 24 h. au maximum chez adultes seulement ; en solution huileuse ou glycéro-alcoolique à $\frac{1}{4}$ milligr. par cc. — Ne pas continuer plus de 5 jours de suite, s'accumule. — *Douloureux.* — *Très toxique.*

Dionine. — Chlorhydrate d'éthylmorphine. — *S. eau.* — *Ind.* : Celles de la morphine. — *Pos.* : 0 gr. 02 à 0 gr. 03 par 24 h.

Duboisine. — *F. us.* : Sulfate. — *P. T.* : Succédané de l'atropine —