

LES PANSEMENTS VAGINAUX

Les pansements vaginaux sont destinés à porter des agents médicamenteux à la surface du vagin et au col de l'utérus. On se sert d'un disque de coton hydrophile ou de gaze iodoformée serrés dans leur milieu à l'aide d'un fil de soie aseptique : le tout est appliqué à l'aide d'une pince contre le col, le fil de soie pendant au dehors, afin que la malade puisse retirer le tampon au moment voulu. Un autre tampon placé dans le vagin maintiendra le premier ; au bout de vingt-quatre heures, on les retire et on les replace. Si l'on use d'un liquide, il sera toujours préférable d'exprimer fortement le tampon, de façon que l'excès de liquide n'exerce pas d'action caustique sur les parois vaginales. Cette précaution est surtout nécessaire quand on emploie la teinture d'iode ou le perchlorure de fer.

Un autre mode de pansement consiste à utiliser les ovules médicamenteux à base de glycérine : la glycérine fond sous l'influence de la chaleur, et la substance médicamenteuse se met directement au contact du vagin et du col utérin.

Un tampon d'ouate ou de gaze maintient l'ovule en place.

Les substances destinées aux pansements vaginaux sont multiples. Citons surtout la glycérine neutre, le tannin, l'iodoforme, l'ichtyol, le thiol.

La glycérine pure possède des propriétés hygroscopiques qui pompent les sécrétions et donnent lieu à un écoulement muqueux momentané : d'ordinaire, on l'associe au tannin :

Glycérine.....	50 grammes
Tannin.....	10 —

Usage externe.